

تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی طریف کودکان کم‌توان ذهنی

*لطیفه قاسم‌پور^۱، فاطمه سادات حسینی^۲، حسن محمدزاده^۳

Effect of Sensory Integration Training on Fine Motor Skills in Children with Trainable Mental Retardation

*Ghasempour L.¹, Hosseini F.S.², Mohammadzadeh H.³

Abstract

Objectives: To investigate the effectiveness of sensory integration training on fine motor skills development in children with trainable mental retardation.

Methods: A quasi-experimental study was conducted. Forty mentally retarded children from 'Golhaye Behesht Rehabilitation and Training Center' were selected through purposive sampling. The participants' Mean \pm SD age was 8.48 ± 2.81 years and their mean IQ was 30.62 ± 6.81 . All children were pretested. Then, they were aligned (homogeneity) based on their IQ and pretest scores and divided into 2 groups: experimental & control. Each group consisted of 10 boys & 10 girls. In this research the fine motor skills section of the 'Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency' was used. Sensory stimulation and physical exercises were practiced by the experimental group during 50 sessions. Each session was 45 minutes long and was held 6 times a week. The control group used the class programs. After 50 sessions both groups were tested. To test the research hypothesis the student's t-test was applied using SPSS 19.

Results: There was a significant difference in post-test between the two groups ($p<0.05$). The experimental group had scored higher.

Conclusions: Sensory-Motor Integration training improved fine motor skills, and the effect of this training was noticeably greater than class programs.

Keywords: Sensory Motor Integration, Trainable Mental Retardation, Fine Motor Skills.

Accepted: 16/07/2013

Received: 14/05/2013

امداد و پشتیبانی
دانشجویی

امداد و پشتیبانی
دانشجویی

چکیده

هدف: بررسی تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی طریف کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر بود.

روش بررسی: روش مطالعه نیمه‌تجربی بود. ۴۰ کودک کم‌توان ذهنی از مرکز توانبخشی و آموزشی گل‌های بهشت شهر ارومیه با میانگین سنی 30.62 ± 6.81 سال و ضریب هوشی 8.48 ± 2.81 با روش نمونه‌گیری هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند. از همه کودکان پیش‌آزمون گرفته شد. سپس براساس ضریب هوشی و نمرات پیش‌آزمون، نمونه‌ها به دو گروه همتراز (همگن) تقسیم شده و به عنوان گروه‌های مداخله و کنترل در نظر گرفته شدند. هر گروه شامل ۱۰ دختر و ۱۰ پسر بود. در این پژوهش، بخش‌های مربوط به مهارت‌های حرکتی طریف از آزمون تحریکات حسی و تمرینات حرکتی برینکس ازرتسکی استفاده شد. تحریکات حسی و تمرینات بدنی توسط گروه آزمایش در طی ۵۰ جلسه تمرین؛ هر جلسه ۴۵ دقیقه و ۶ بار در هفته تمرین شد. گروه کنترل از برنامه‌های آموزشی کلاس استفاده نمودند. پس از ۵۰ جلسه، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون تی استادن (SPSS 19) بهره گرفته شد.

یافته‌ها: تفاوت معناداری در نمرات پس‌آزمون مابین گروه‌های آزمایش و کنترل وجود داشت ($p<0.05$). گروه مداخله نمرات بیشتری کسب کرد.

نتیجه‌گیری: تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی سبب رشد مهارت‌های حرکتی طریف شد و این تأثیر به طور قابل توجهی بیشتر از برنامه آموزش کلاسی بود.

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی حسی- حرکتی، کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر،

مهارت‌های حرکتی طریف

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، استادیار دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران: ۲. دکتری روانشناسی ورزشی دانشگاه ارومیه، دانشیار دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. *آدرس نویسنده مسئول: ارومیه، خ دکتر بهشتی، دانشگاه ارومیه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: *تلفن: ۰۹۱۴۴۴۸۴۶۹۳؛ *رایانame: ghasempourlatifeh@yahoo.com

1.MSc in Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran; 2. PhD in Sport Psychology, Assistant Professor of Urmia University, Urmia, Iran; 3. PhD in Motor Behavior, Associate Professor of Urmia University, Urmia, Iran.

*Corresponding Author's Address: School of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Doctor Beheshti St., Urmia, Iran; Tel: +98 914 4484693; E-mail: ghasempourlatifeh@yahoo.com

مقدمه

گفت که احتمالاً در کودکان نابهنجار (از جمله کودکان عقب‌مانده ذهنی) ارتباط‌های مناسب بین ادراک و حرکت در طول فرآیند رشد و بهویژه دوره‌های حساس شکل نگرفته است. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان با فراهم کردن فعالیت‌ها و تجربیات حسی - حرکتی برای این دسته از کودکان زمینه رشد بهنجار آن‌ها را فراهم کرد؟ برخی مانند کفارت، گتمن، بارش، گزل و پیازه معتقدند حرکت و یادگیری حرکتی مبدأ تمام ادراکات و یادگیری‌های است و فرآیندهای ذهنی عالی‌تر، پس از رشد سیستم‌های حرکتی و ادراکی و برقراری ارتباط میان یادگیری حرکات و ادراک به وجود می‌آیند (۲). عملکرد مناسب مغز انسان مستلزم این است که از طریق محرك‌های محیطی تحریک شود. اهمیت این تحریکات برای رشد حسی - حرکتی دوران کودکی در تحقیقات به خوبی تأیید شده است (۳). بنابراین می‌توان گفت که تمرینات حرکتی و مهارت‌های ادراکی - حرکتی می‌تواند نقش تحریک‌کننده را برای سیستم عصبی ایفا کند. البته کم‌توانان ذهنی به علت و قفعه یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده مطلوب از برنامه‌های معمولی آموزش‌وپرورش، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نبوده و بهدلیل عقب‌ماندگی هوشی، از ادراک مبانی و مفاهیم و از قدرت استدلال و قضاویت صحیح و از توانائی دقت و یادگیری، به درجات مختلف محرومند (۴). این کودکان با تأخیر در رشد مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف نیز روبرو هستند که می‌تواند بر ابعاد مختلف رشد و عملکرد کودک در فعالیت‌های روزمره زندگی آنان تأثیر بگذارد. نقص‌های یکپارچگی و پردازش حسی یکی از عوامل مهم در مشکلات حرکتی این کودکان است. رویکرد یکپارچگی حسی از طریق بهبود کارکرد سامانه عصبی مرکزی در پردازش و یکپارچگی اطلاعات می‌تواند موجب بهبود رشد حرکتی آنان شود (۱). حدود هفت درصد افراد عقب‌مانده ذهنی، عقب‌ماندگان ذهنی تربیت‌پذیر

کودکان در حین رشد، مهارت‌های جابه‌جایی پایه^۱ و مهارت‌های دستکاری^۲ را کسب می‌کنند، لیکن بین آنچه آن‌ها در شروع به شکل ابتدائی و خشن اجرا می‌کنند با آنچه یک قهرمان به شکل حرکات موزون نرم و قدرتمند انجام می‌دهد تفاوت زیادی وجود دارد. افراد طی مراحلی به الگوهای کارآمد حرکت دست می‌یابند. کودک الگوهای حرکت کارآمد را از نظر مکانیکی گام‌به‌گام کسب می‌کند. این تغییرات کیفی هستند؛ یعنی کودکان کیفیت حرکات را بهبود می‌بخشند. این امر انعکاسی است از تعامل پیچیده موجود در کودک در حال رشد، مهارت (وظیفه‌ای که کودک برای اجرای آن تلاش می‌کند) و محیط که شامل فضا و وسائل در دسترس می‌شود. ایجاد فرصت‌های مناسب برای تمرین، تعامل فوق را تسهیل می‌کند. کودکان تنها در نتیجه رشد و بهطور خودکار الگوهای حرکت ماهرانه را کسب نمی‌کنند. دست‌اندرکاران رشد حرکتی کودکان می‌توانند فرصت‌های تمرینی را مهیا کنند. آن‌ها می‌توانند با ایجاد فضا و ارائه انواع وسائل مورد نیاز، کودکان را با اهداف مناسب مختلف روبرو کنند (۱). سندروم عقب‌ماندگی (کم‌توانی) ذهنی یکی از ناهنجاری‌های ادراکی - حرکتی دوران رشد است که قبل از نوجوانی بروز می‌کند و بهطور مشخص به کودکانی اطلاق می‌شود که در سازوکارهای شناختی و برخی رفتارهای سازشی^۳ نقص دارند. بهطور سنتی کودکانی با بهره هوشی کمتر از ۷۰ جزء افراد کم‌توان ذهنی دسته‌بندی می‌شوند. در طول فرآیند رشد حرکتی، در کودکان بهنجار، اطلاعات ادراکی و حرکتی به صورت طبیعی پیوند برقرار می‌کنند (۲). به اعتقاد برخی متخصصان رشد حرکتی، مانند دلاکاتو، بسیاری از مشکلات یادگیری حاصل نابسامانی‌هایی است که بر اثر عوامل ثانی، عفونت‌های بارداری یا محرومیت‌های محیطی دوران رشد، در سیستم عصبی ایجاد می‌شود (۳). بنابراین می‌توان نتیجه

¹ Decalage Fundamental Skills

² Manipulation Skills

معلومان با توجه به ویژگی آنان دو چندان بوده و موجبات رفع آثار و عوارض ناشی از ناتوانی را فراهم می‌کند (۴). متأسفانه افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی شدید متعاقب شدت بالای ناتوانی، کمبود امکانات ورزشی جهت انجام ورزش‌های رسمی یا رقابتی و نیز نگرش منفی به آن‌ها و عدم استقبال والدین، از برنامه‌های ورزشی کنار گذاشته شده و برنامه‌های غنی‌سازی حرکتی شان ضعیف شده و با تأخیر اجرا می‌شود. چنین موضع عمده‌یا غیرعمده‌ی، این افراد را به سمت بی‌تحرکی می‌کشاند (۴). فرآیند یکپارچگی حسی، در اثر انجام تمرینات توانبخشی و نیز تمرینات ورزشی ایجاد می‌شود. هرچند که از اهداف اولیه درمان یا تمرینات نباشد، لیکن با به کاربردن تمرینات منظم و هدفمند می‌توان شاهد پیشرفت‌هایی در مهارت‌های حرکتی این دسته از کودکان شد (۵). همچنین به اعتقاد اغلب متخصصان، برنامه‌های تربیت‌بدنی برای کودکانی که نقص‌های ادراکی-حرکتی دارند، باید ساختاری منسجم داشته و با نیازها و مشکلات آن‌ها متناسب باشد (۷). بنابراین متخصصین توانبخشی روش آموزش مهارت‌های حرکتی را شیوه مناسب و مؤثر در درمان این اختلالات می‌دانند و معتقدند که این روش به عنوان پایه‌ای جهت بهبود عملکرد عالی مغز بوده و موجب بهبود عملکردهای حرکتی و شناختی کودکان و نوجوانان ناتوان می‌شود (۵). البته ممکن است کودکان کم‌توان ذهنی با داشتن سطح آمادگی پایین، در معرض خطر بیماری‌های حرکتی، قلب و عروقی، فشارخون بالا و سطح کلسترول بالا باشند. ضعف عملکرد حرکتی و آمادگی جسمانی در پی نداشتن تلاش و تمرین مداوم باعث پایین‌آمدن عزت نفس آن‌ها شده و در نتیجه سبب کاهش مشارکت می‌شود. علاوه بر کمبود مشارکت، ضعف عملکرد حرکتی و آمادگی جسمانی را نیز به دنبال خواهد داشت. با توجه به ضعف مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف در این کودکان و اهمیت این مهارت‌ها و با توجه به این موضوع که فعالیت‌های بدنه منجر به سلامت جسمانی، بهبود عملکرد عقلانی، ادراک رفتار و احساسات و شخصیت فرد می‌شود، احتمالاً تمرینات بدنه بتواند

هستند (۵). توانایی این افراد معادل توانایی یک کودک در سال‌های اول دبستان است. تفاوت‌های فردی در میان آن‌ها کمتر از گروه‌های دیگر عقب‌ماندگان ذهنی است. این گروه معمولاً دارای اختلالات هوش، همراه با ناهنجاری‌های واضح حسی- حرکتی هستند (۴). تعداد قابل توجهی از آنان دارای مشکلات متعدد ثانویه در مهارت‌های خودداری و دیگریاری هستند (۵). آنان با استفاده از روش‌های خاص توانبخشی (جهت بهبود ادراک‌های حسی مختلف برای افزایش مهارت‌های حرکتی مختلف) و همچنین شرکت در کلاس‌های آموزشی مؤسسات توانبخشی قادر خواهند بود امور شخصی خود را نسبتاً فراگرفته، به بسیاری از مفاهیم ابتدایی زندگی دست یافته و استقلال بیشتری داشته باشند. توانبخشی این گروه با صرف وقت زیاد و مستمر و شکنیابی بسیار صورت می‌گیرد. از آنجا که آنان مطالب آموخته شده را به سرعت از یاد می‌برند، بنابراین مداومت و تکرار در آموزش آنان امری ضروری است (۴). یکپارچگی حسی- حرکتی فرآیندی است که از دوران نوازدی شروع شده و اساس شناخت حس‌ها و یادگیری حرکات است. به نظر می‌رسد هر چه کودکان در زمینه دریافت و پرداخت محرك‌های ورودی، کارآمدتر شوند در فهم و درک محیط و در نتیجه در بیان و توصیف خود تواناتر خواهند بود. می‌توان بعضی از پیشرفت‌های کودکان در زمینه مهارت‌های حرکتی را به رشد و بالیدگی، عملکرد حواس و ادراک آن‌ها ربط داد. کودکان به تدریج می‌توانند اطلاعات ادراکی را بهتر انتخاب کرده، پس از پردازش، آن‌ها را سازمان داده، به صورت یکپارچه درآورند و با تجرب فزاینده مهارت‌های حرکتی خود، هماهنگ کرده، پیشرفت کنند. حاصل این کار اجرای بهتر مهارت‌های حرکتی خواهد بود. مقدار زیادی از این پیشرفت در عملکرد ادراک در دوره اولیه کودکی روی می‌دهد و سپس در دوره پایانی کودکی و نوجوانی به طور نامحسوس پالایش می‌شود (۶). ورزش به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در زمینه توانبخشی اجتماعی معلومان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. به‌واقع اهمیت ورزش برای

دانش آموزان مرکز روزانه توانبخشی و آموزشی گل های بهشت به شرح زیر انتخاب شدند: ابتدا فهرستی از کودکان دارای ملاک های مورد نظر از بین تمامی دانش آموزان بر مبنای پرونده پزشکی آنها جهت آگاهی از سطح هوشی شان (بر مبنای ارزیابی روانشناس با تست وکسلر و وايلند)، بیماری های زمینه ای و نیز داروهای مصرفی تهیه شد. سپس به جهت رعایت ملاحظات اخلاقی، فرآیند و اهداف پژوهش به طور کامل به اطلاع والدین ۴۵ کودک که واجد شرایط و کاندید بررسی در این مطالعه بودند، رسید و رضایت آگاهانه ایشان جلب شد (رضایت کتبی). به آنها اطمینان داده شد که ضمن حفظ اسمی و اطلاعات شخصی نمونه ها و خانواده هایشان، هیچ خطری متوجه کودک آنها نخواهد بود. در مرحله بعدی مهارت های حرکتی ظرفی نمونه ها با استفاده از آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی (خرده مقیاس های ۶، ۷، ۸) مورد سنجش قرار گرفت. به منظور اطمینان از توزیع همگن و یکسان نمونه ها در دو گروه مداخله و کنترل، ۴۰ نفر از شرکت کنندگان براساس ضریب هوشی^۱ و نمرات پیش آزمون، همتراز شده و به دو گروه همگن تقسیم شدند. یکی از گروه ها به عنوان گروه مداخله و دیگری به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند (جنسیت به طور مساوی، ۱۰ دختر و ۱۰ پسر در هر گروه، در درون گروه ها توزیع شد). گروه کنترل از آموزش های معمول کلاس های آموزشی بهره مند بودند. گروه مداخله به تعداد ۵۰ جلسه و ۶ روز در هفتة و هر جلسه به مدت ۴۵ دقیقه تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی را به صورت گروهی (با تقلید از حرکات مری و تلاش برای هماهنگ شدن با گروه) به صورت همزمان به همراه خواندن ترانه های کودکانه و به عنوان زنگ ورزش در سالن همان مرکز یا به عنوان زنگ هنر در یکی از کلاس ها انجام دادند. در هر جلسه حضور و غیاب از شرکت کنندگان به عمل آمد. برای غائبين تا ۱۵ جلسه جبرانی نیز برگزار شد. در تمامی جلسات تمرین مربیان کلاس ها به دلیل آشنایی با ویژگی های شخصیتی کودکان حضور داشته و در انجام

مزایای زیادی برای این قبیل کودکان به همراه داشته باشد. با بررسی مشکلات این کودکان و مطالعه پژوهش های انجام گرفته که البته در گروه کودکان با ناتوانی ذهنی شدید بسیار اندک است، به نظر می رسد این کودکان در رشد حرکتی شان نیاز به بررسی های بیشتری دارند. به علاوه بررسی سودمندی این تمرینات در ناتوانی های مختلف (به صورت مجزا) نیاز به پژوهش های متعدد دارد. همچنین مطالعات نشان داده اند که با غنی سازی محیط رشد و ایجاد فرصت های مناسب تمرینی می توان تا حدودی این کودکان را به روند عادی زندگی شان برگرداند. مهارت های حرکتی پایه تشکیل دهنده تمام حرکات بدن هستند، بنابراین مسئله ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بهترین زمان رشد این مهارت ها سنین کودکی و آغاز نوجوانی است. از سوی دیگر تمرین های حرکتی همراه با بازی به عنوان عاملی بسیار مهم در رشد مهارت های حرکتی هستند. به نظر می رسد که بازی های هدفمند و برنامه ریزی شده با توجه به دربرداشتن عناصر حرکت و تفکر و رقابت از بهترین راه های تسهیل در رشد مهارت های حرکتی باشند. به خصوص در زمینه کودکان کم توان ذهنی شدید به دلیل کمبودن تجرب اجتماعی آنها به دلایل فرهنگی و اجتماعی ذکر شده، بازی در گروه همسالانشان که شرایط مشابهی با آنها دارند، باعث غنی شدن تجرب حرکتی و اجتماعی آنان برای ادامه مستقل زندگی شان می شود. از موارد قابل توجه که این مسئله اساسی را برای محقق به وجود آورد: قابلیت اصلاح پذیری کودکان در زمینه های رشد (جسمانی، عاطفی و ...) است که با ارائه تمرینات حرکتی منظم می توان تجرب حرکتی این کودکان را تحت تأثیر قرار داده و تا حدودی از مشکلات ثانویه که در اثر سطح آمادگی جسمانی پایین ایجاد می شود؛ کاست.

روش بررسی

شرکت کنندگان در این پژوهش نیمه تجربی، ۴۰ کودک با میانگین سنی $8/48 \pm 2/81$ سال بودند که از بین

¹ Intelligence Quotient

تمرینات همکاری نمودند. پس از پایان دوره تمرینات مجدداً از دو گروه پس آزمون به عمل آمد.

آزمون تبحر حرکتی برینیکس-اوزرتسکی، مقیاس حرکتی هنجار مرجعی برای مهارت‌های حرکتی درشت و ظرفیت کودکان ۴/۵ تا ۱۴/۵ ساله است. این آزمون به محققین کمک می‌کند تا کودکان به هنجار را از کودکان با اختلال حرکتی شناسایی کند. این مقیاس شامل ۸ خرده‌آزمون بوده که فرم طولانی آن ۴۶ و فرم کوتاه آن ۱۴ ماده دارد. ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون در فرم طولانی ۰/۸۷ و در فرم کوتاه ۰/۸۶ گزارش شده است. چهار خرده‌آزمون آن، مهارت‌های های حرکتی درشت، سه خرده‌آزمون دیگر مهارت‌های های حرکتی ظرفی و یک خرده‌آزمون هر دو مهارت‌های حرکتی را می‌سنجند. این آزمون توسط دکتر محمد کاظم واعظ موسوی (۱۳۸۴) در ایران هنجاریابی شده است.

ملاک‌های ورود به این مطالعه عبارت بودند از: ابتلاء به عقب‌ماندگی در حد شدید، عدم استفاده از تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی طی دوره مطالعه یا پیش از آن (غیر از زمان انجام تمرینات) و داوطلب بودن و رضایت کودک.

ملاک‌های خروج نیز عبارت بودند از: وجود اختلال‌های تشنج شدید، وجود اختلالات ارتوپدیک، وجود اختلالات قلبی-ریوی و فلجه مغزی، عدم شرکت در جلسات تمرین طی شش جلسه مداوم یا بیشتر، عدم شرکت در جلسات تمرین در حداقل ۱۵ جلسه در کل دوره مطالعه و ابتلاء کودک به بیماری شدید طی دوره تمرین به گونه‌ای که نیاز به بستری شدن یا عمل جراحی داشته باشد. شایان ذکر است یک نفر از شرکت‌کنندگان گروه مداخله نیز به دلیل شکستگی بازو و عدم امکان حضور در جلسات جایگزین شد.

اهداف کلی تمرینات این پژوهش شامل (تقویت برنامه‌بازی حرکتی، تقویت هماهنگی حرکتی دوطرفه، تقویت حس لامسه، تقویت حس عمقی) بود (۸). فهرست فعالیت‌ها جهت رشد مهارت‌های حرکتی ظرفی به صورت کلی شامل موارد ذیل بود: نقاشی کردن با مدادرنگی و ماژیک واپتبرد، نقاشی با انگشت با چشم‌های بسته توسط مخلوطی از موادی

مانند ماسه، خاک اره و کاغذ پانچ شده که به رنگ اضافه شده و نقاشی با گواش، رسم خطوط از روی الگو، نوشتن و ترسیم با گچ بر روی تخته سیاه، نوشتن بر روی تکه‌ای موکت با گچ نرم و پاک کردن آن با دست، پا یا ساعد (بدون لباس، کفش یا جوراب) توسط کودک، درازکشیدن بر پشت روی زمین و خم کردن ساق‌ها (پاها) و بالا آوردن آن‌ها و تلاش برای نقاشی کردن بر روی تکه کاغذی که به زانوها وصل می‌شوند، درحالی که کودک می‌دید چه می‌کشد، پاره کردن از روی خطوط رسم شده، مچاله کردن کاغذ، درست کردن توب کاغذی و پرتاپ به سمت هدف تعیین شده، انداختن توب‌های کوچک یا بادکنک درون طروف گود و جابه‌جا کردن آن‌ها به یکدیگر، بریدن دور اشکال با قیچی، بریدن خطوط مشخص رسم شده، بریدن طرح‌های ساده روی کاغذ و مقوا با قیچی، تمرین‌های مختلف با تیپ مانند فشاردادن و غلتاندن آن با انگشتان و دست، تحمل وزن بر روی دست در وضعیت‌های مختلف، تعیین نرمی یا زبری اشیاء با چشمان بسته، تمرین‌های متنوع با مهره‌های رنگی، ساختن مجسمه با گل رس یا خمیربازی، ساختن کلاژ، ساختن کاردستی با چسب، جدا کردن حبوبات که با هم قاطی شده، انداختن حبوبات در بطری‌هایی با سوراخ‌های قابل تنظیم (از لحاظ قطر)، ضربه‌زدن به یک شیء ثابت با یک دست، ضربه‌زدن به یک شیء ثابت با دو دست، پرتاپ کیسه‌های حبوبات یا توب به سمت یکدیگر و تلاش برای دریافت موفقیت‌آمیز آن، پیدا کردن اشیای درخواست شده از درون جعبه بزرگ با چشمان بسته، ساختن شکل‌های فرضی با انگشتان و ...).

داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۹ مورد بررسی و شناخته‌های آماری (میانگین و انحراف معیار) نمرات مهارت‌های حرکتی ظرفی شرکت‌کنندگان محاسبه شده و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون تی استودنت جهت مقایسه میانگین‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

در این بخش اطلاعات جمعیت‌شناسخی مانند

جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱. میانگین و انحراف استاندارد سن و ضریب هوشی گروه‌ها

گروه	ضریب هوشی مقدار P	انحراف استاندارد میانگین سن	مقدار	انحراف استاندارد میانگین
گروه آزمون (n=۲۰)	۰/۷۳	۳۱/۱۰±۶/۹۹	۰/۲۰	۷/۹۱±۳/۰۰
		۳۰/۲۵±۶/۷۸		۹/۵۰±۲/۵۶
گروه کنترل (n=۲۰)				

بوده است ($p<0.001$). به عبارت دیگر مهارت‌های حرکتی ظریف در گروه کنترل نیز پیشرفت معنادار داشت. این پیشرفت در گروه کنترل می‌توانست چندین دلیل داشته باشد: تأثیر زمان و رشد، تأثیر یادگیری مشاهده‌ای، استفاده گروه کنترل از آموزش‌های کلاسی در طی مدت پژوهش، اثر پیش‌آزمون و همچنین پایین‌بودن میانگین نمرات پیش‌آزمون در حدی که SPSS کمترین اختلاف را معنادار نشان بدهد (جدول ۲).

در ادامه بررسی نتایج این مطالعه، ابتدا به بررسی کلی نمرات حرکات ظریف بین دو گروه مداخله و کنترل پرداخته و سپس به نمرات کسب شده در سه خرده‌آزمون حرکات ظریف اشاره کرده و با یکدیگر مقایسه نمودیم. با توجه به مقدار p به دست آمده از آزمون t وابسته ملاحظه شد که تفاوت نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون حرکات ظریف در گروه مداخله از نظر آماری معنادار بود ($p<0.001$). همچنین تفاوت نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون حرکات ظریف در گروه کنترل نیز از نظر آماری معنادار

جدول ۲. آزمون t وابسته برای مقایسه نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون مهارت‌های حرکتی ظریف در هر یک از گروه‌های مداخله و کنترل

گروه	نوع آزمون	انحراف استاندارد میانگین	مقدار احتمال	t
مداخله	پیش‌آزمون	۱۱/۲۵±۶/۳۰	<0.001	-۱۸/۹۷
	پس‌آزمون	۱۷/۶۰±۶/۸۷		
کنترل	پیش‌آزمون	۱۱/۵۰±۴/۵۲	<0.001	-۴/۸۷
	پس‌آزمون	۱۲/۵۰±۴/۸۱		

معنادار بوده ($p=0.012$): به بیان دیگر گروه کنترل تنها در بخش سرعت و چالاکی اندام فوقانی پیشرفت معنادار داشته است (جدول ۳).

با مقایسه نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در خرده‌آزمون‌های ۶، ۷، ۸ مشاهده شد که تفاوت نمرات هر سه خرده‌آزمون در گروه مداخله از نظر آماری معنادار بوده ($p<0.001$). لیکن در گروه کنترل این تفاوت تنها در خرده‌آزمون

جدول ۳. آزمون t وابسته برای مقایسه نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون خرده‌آزمون‌های مهارت‌های حرکتی ظریف در هر یک از گروه‌های مداخله و کنترل

گروه	نوع خرده‌آزمون	انحراف استاندارد میانگین	t	مقدار احتمال
مداخله	خرده‌آزمون ۶- سرعت پاسخ	پیش‌آزمون ۱/۸۵±۰/۷۴	-۱۲/۴۶	<0.001
		پس‌آزمون ۳/۲۵±۰/۹۱		
مداخله	خرده‌آزمون ۷- کنترل بینائی- حرکتی	پیش‌آزمون ۱/۸۵±۱/۱۸	-۱۰/۲۶	<0.001
		پس‌آزمون ۳/۰۵±۱/۱۹		
مداخله	خرده‌آزمون ۸- سرعت و چالاکی اندام فوقانی	پیش‌آزمون ۷/۵۵±۵/۴۷	-۱۷/۳۵	<0.001
		پس‌آزمون ۱۱/۳۰±۵/۹۴		

۰/۰۴	-۲/۱۸	۱/۸۰±۰/۷۷	پیش آزمون	خرده آزمون ۶- سرعت پاسخ	کنترل	
		۲/۲۰±۰/۹۵	پس آزمون			
۰/۰۲	-۲/۵۲	۲/۱۰±۱/۰۲	پیش آزمون	خرده آزمون ۷- کنترل بینائی- حرکتی		
		۲/۳۵±۰/۸۷	پس آزمون			
۰/۰۱۲	-۲/۶۷	۷/۶۰±۴/۴۵	پیش آزمون	خرده آزمون ۸- سرعت و چالاکی اندام فوقانی		
		۷/۹۵±۴/۲۷	پس آزمون			

نداشته است ($p=0/89$). به عبارت ساده‌تر عدم معناداری تأییدی بر توزیع نمونه‌ها به صورت همتراز در دو گروه بود. اما میانگین اختلاف امتیازات پس آزمون حرکات ظریف در این گروه‌ها معنادار بود ($p=0/01$) (جدول ۲).

جدول ۴. آزمون مستقل برای مقایسه نمرات خرده آزمون‌های پیش آزمون و پس آزمون مهارت‌های حرکتی ظریف بین دو گروه مداخله و کنترل

P	انحراف استاندارد میانگین		نوع آزمون	کنترل
	گروه کنترل	گروه آزمایش		
۰/۸۹	۱۱/۵۰±۴/۵۲	۱۱/۲۵±۶/۲۹	پیش آزمون	
۰/۰۱	۱۲/۵۰±۴/۸۱	۱۷/۶۰±۶/۸۷	پس آزمون	

پس آزمون بین دو گروه در خرده آزمون‌های شماره ۶ ($p=0/01$), خرده آزمون شماره ۷ ($p=0/05$) و خرده آزمون شماره ۸ ($p=0/05$) معنادار است. به عبارت دیگر گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تنها در سرعت پاسخ تفاوت معناداری داشته است (جدول ۵).

در بررسی میانگین اختلاف نمرات پیش آزمون گروه‌های مداخله و کنترل با آزمون تی مستقل و با فرض عدم یکسانی واریانس‌ها، مشاهده شد که میانگین امتیازات پیش آزمون حرکات ظریف بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری

جدول ۴. آزمون مستقل برای مقایسه نمرات خرده آزمون‌های پیش آزمون و پس آزمون مهارت‌های حرکتی ظریف بین دو گروه مداخله و کنترل

همچنین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خرده آزمون‌های ۶، ۷، ۸ در میان دو گروه نیز با آزمون t مستقل بررسی و مشاهده شد که بین نمرات هر سه خرده مقیاس تفاوت معناداری وجود نداشته است (براساس مقدار p در جدول ۳). لیکن با بررسی نمرات پس آزمون هر سه خرده مقیاس معلوم شد که تفاوت نمرات

جدول ۵. آزمون t مستقل برای مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون خرده آزمون‌های مهارت‌های حرکتی ظریف بین دو گروه مداخله و کنترل

مقدار p	انحراف استاندارد میانگین		نوع خرده آزمون‌ها	کنترل
	گروه کنترل	گروه آزمایش		
۰/۸۴	۱/۸۰±۰/۷۷	۱/۸۵±۰/۷۴	پیش آزمون	خرده آزمون ۶-
۰/۰۰۱	۲/۲۰±۰/۹۵	۳/۲۵±۰/۹۱	پس آزمون	سرعت پاسخ
۰/۴۸	۲/۱۰±۱/۰۲	۱/۸۵±۱/۱۸	پیش آزمون	خرده آزمون ۷- کنترل
۰/۰۴	۲/۳۵±۰/۸۷	۳/۰۵±۱/۱۹	پس آزمون	بینائی- حرکتی
۰/۹۷	۷/۶۰±۴/۴۵	۷/۵۵±۵/۴۷	پیش آزمون	خرده آزمون ۸- سرعت
۰/۰۵	۷/۹۵±۴/۲۷	۱۱/۳۰±۵/۹۵	پس آزمون	و چابکی اندام فوقانی

هستند. یکی از عوامل محیطی مهم در رشد این توانایی‌ها، فراهم بودن فرصت‌های یادگیری و محیط‌های فعال برای کسب تجربیات ادراکی و

بحث

توانایی‌های ادراکی- حرکتی و رشد بهنجار آن‌ها با نسبت‌های متفاوت تحت تأثیر وراثت و محیط

بعد از تولد...) بوده و تمامی شرکت‌کنندگان دارای عقب‌ماندگی ذهنی شدید بودند (بهرهٔ هوشی ۲۵ تا ۵۰). یانیک، یومین و کایهان (۲۰۰۳) اثربخشی شیوه‌های درمان یکپارچگی حسی، تلفیق درمان یکپارچگی حسی و تحریک دهلیزی و درمان رشد عصبی را بر کودکان ۷ تا ۱۰ ساله با شانگان داون مقایسه نمودند که اثربخشی هر سه برنامه تأیید شد و نتایج درمان در سه گروه مداخله، تفاوت معناداری را نشان نداد. البته در گروه درمان یکپارچگی حسی بهبود معناداری در رابطه با خردآزمون‌های مربوط به یکپارچگی حسی و مهارت‌های حرکتی ظریف مشاهده شد (۱۱). ورگاس و کاملی (۱۹۹۹) در فراتحلیلی از پژوهش‌های مداخله‌ای مربوط به درمان یکپارچگی حسی، مطالعاتی که طی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۷ اجرا و گزارش شده بود را بررسی نمودند که براساس یافته‌های این پژوهش، نتایج حرکتی و روانی-آموزشی بهتر از سایر حوزه‌ها بود. همچنین درمان یکپارچگی حسی در مقایسه با موارد بدون درمان، تأثیر مطلوبی را نشان داد، ولی در مقایسه با سایر درمان‌های جایگزین برتری معناداری را نشان نداد. به علاوه در مطالعات قدیمی‌تر در مقایسه با مطالعات جدیدتر، تأثیر مطلوب‌تری مشاهده شد (۱۲). این یافته می‌تواند چندین دلیل داشته باشد: اول اینکه پروتکل درمان در مطالعات جدیدتر، انعطاف‌پذیر نبوده و با ماهیت کودک‌محور بودن، منحصربه‌فرد بودن و پویایی درمان یکپارچگی حسی ناسازگار است. به همین دلیل یکسان‌سازی درمان، چالش مهمی برای پژوهشگران ایجاد نموده است (۱۰). البته همین مسئله توسط اسکاف و میلر (۲۰۰۵) نیز مطرح شده است (۱۳). استدلال قوی‌تر اینکه در پژوهش‌های قدیمی‌تر درمان یکپارچگی حسی در چهارچوب مرجع کاردترمانی، بر مفاهیمی همچون چالش کاملاً مناسب و مشارکت فعالانه تأکید داشت، ولی در پژوهش‌های جدیدتر اینگونه نبوده است. دلیل دیگر اینکه در پژوهش‌های اخیر، به جای نتایج، بهویژه هدف‌گذاری شده، نتایج متعددی در نظر گرفته شده است. از این رو به دلیل نبودن فرضیه‌ای قوی درباره ارتباط بین تمرینات و

حرکتی در دوره‌های حساس رشدی، بهویژه دوران کودکی است (۲). با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرفت که آیا می‌توان با فراهم‌کردن شرایطی خاص مانند انجام تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی، عقب‌ماندگی‌های حرکتی گروه خاصی از کودکان عقب‌مانده ذهنی تربیت‌پذیر را که به هر دلیل از رشد بهنجار شناختی یا ادراکی-حرکتی برخوردار نیستند، جبران کرد و موجب ارتقای عملکرد آن‌ها در آزمون‌های ادراکی-حرکتی شد؟ با توجه به یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان چنین استنباط نمود که تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی در این پژوهش موجب بهبود مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر می‌شود و این بهبود قوی‌تر از تأثیر آموزش کلاسی است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که می‌توان با فراهم‌کردن شرایطی برای شرکت کودکانی که از ناتوانی‌های ذهنی رنج می‌برند، از شدت برخی اختلال‌های ادراکی-حرکتی آن‌ها کاست. یافته‌های پژوهش نوری و همکاران (۲۰۱۰) نیز سودمندی تمرینات یکپارچگی حسی بر بهبود مهارت‌های حرکتی درشت دستی و مهارت‌های ظریف انگشتی کودکان با فلج مغزی ۸ تا ۱۲ ساله را نشان داده است (۹). تفاوت بین شرکت‌کنندگان در پژوهش نوری و پژوهش حاضر این بود که هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان در پژوهش نوری دارای عقب‌ماندگی ذهنی شدید و عمیق نبوده و ناتوانی گالب در آن‌ها فلح مغزی بود. یافته‌های پژوهش با نتایج ملاجانی (۲۰۰۶) در ارتباط با تأثیر تحریکات حرکتی و تمرینات حرکتی بر مهارت‌های دستی در کودکان کم‌توان هوشی هماهنگ بوده است (۹). سورتچی و همکاران (۲۰۰۷) اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف را نشان دادند (۱۰). در پژوهش سورتچی نیز نمونه‌ها تنها از بین کودکان سندروم داون (بدون داشتن عقب‌ماندگی ذهنی شدید و عمیق) انتخاب شده بودند؛ ولی در پژوهش حاضر علت بروز ناتوانی نمونه‌ها عوامل متعدد (بیماری‌های متابولیک، اختلالات کروموزومی، ضربه مغزی، عوامل حین و

تمرینات ورزشی از نظر اثربخشی به صورت طولانی مدت در نمونه فعلی مقایسه شود؛ ۲. این رویکرد درمانی و ورزشی با حجم وسیع تر و در شهرهای مختلف مطالعه و نتایج با یکدیگر مقایسه شود.

نئی تحریر

با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان توصیه کرد که با طراحی تمرينات حرکتی و اجرای گروهی و مستمر آن در ساعت درس تربیت بدنی ویژه کودکان استثنایی (به‌ویژه کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر) از مشکلات این کودکان در اجرای مهارت‌های ادراکی-حرکتی کاست.

تشریف و قدردانی

از شرکت کنندگان در پژوهش، مسئول مرکز آقای فانوسی و مریان مرکز توابیخسی گلهای بهشت، آقای دکتر سلیمانی و از همکاران گرامی آقایان حسینی، فلاح محمدی نسب، خانم‌ها ناجی‌زاده و علیزاده و نیز برادرم امیر قاسم پورکه ما را در اجرای این پژوهش، باری دادند، سیاستگذاری مه شود.

References

1. Haywood K. Life Span Motor Development. Namazizadeh M, Aslankhany M. (Persian translators). 9th ed. Tehran: SAMT; 2008, pp:306–67.
 2. Bradinova I, Shopova S, Simeonov E. Mental retardation in childhood: clinical and diagnostic profile in 100 children. *Genet Couns*. 2005;16(3):239–48.
 3. Harris JC. Intellectual Disability : Understanding Its Development, Causes, Classification, Evaluation, and Treatment: Understanding Its Development, Causes, Classification, Evaluation, and Treatment. Oxford: Oxford University Press; 2005.
 4. Helmseresht P, Delpisheh A. Handicaps and Principles of Rehabilitation. 1st ed. Tehran: Chehr Pub; 2007, pp:49–67. (Persian)
 5. Davarmanesh A, Baratysadeh F. Precedent of Handicaps Rehabilitation Principles. 1st ed. Tehran: Roshd pub; 2006. pp:169–81. (Persian)
 6. Madany M. Sensory Integration and Tactile Dyficit. Thesis for bachelor of Occupational Therapy. Tehran, Shahid Beheshti University; 1997, pp: 1–40. (Persian)
 7. Nelson RW, Ezraiil AC. Behavior Disorders of Childhood. Monshi Toosi MT. (Persian translator). Mashhad: Astan Ghods Razavi Publication; 1988.
 8. Barbara E. Fink. Sensory-motor integration activities. Raghfar M. (Persian translators). Tehran: Teymorzadeh & Tabib publication; 2004, PP:1–227.

نتایج، احتمالاً نتایج آماری، تأثیر مداخله (تمرینات) را ضعیفتر نشان می‌دهد. دلیل آخر این که عدم همگونی نمونه‌های مورد پژوهش در برخی مطالعات، مانع دستیابی به یافته‌های دقیق می‌شود (۱۰). البته در پژوهش حاضر سعی شده است که موارد فوق رعایت شود تا یافته‌های پژوهش با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش با نتایج یافته‌های هامفریز و همکاران (۱۹۹۰) در ارتباط با تأثیر درمان یکپارچگی حسی و درمان ادراکی-حرکتی بر مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان با اختلالات یکپارچگی حسی و ناتوانی‌های یادگیری نیز هماهنگ به دهد (۱۴).

این پژوهش با محدودیت‌هایی همراه بود که از آن میان می‌توان به گستردگی بودن دامنه سنی نمونه‌ها؛ و متغیر بودن میزان توانایی‌های حرکتی نمونه‌ها اشاره کرد. ضمناً به دلیل اینکه افراد شرکت‌کننده در پژوهش همگی مبتلا به کم‌توانی ذهنی شدید بودند، نتایج به دست آمده قابل تعمیم به سایر گروه‌های ناتوانایی‌ها نیست.

در ادامه این مطالعه می‌توان موارد ذیل را پیشنهاد داد:

9. Nori J, Seifnaraghi M, Ashayeri H. The effect of sensory integration intervention on improvement of gross motor and fine motor skills in children with cerebral palsy aged 8–12. *Journal of Exceptional Education*. 2010;(105):21–31. (Persian)
10. Soratchi H, Sazmand AH, Karbalaii Nori A, Jadidy H. The effect of sensory integration in gross & fine motor skills children 5-7 years with down syndrome. *Journal of Rehabilitation*. 2006;9(2):35-40. (Persian)
11. Uyanik M, Bumin G, KAYİHAN H. Comparison of different therapy approaches in children with Down syndrome. *Pediatrics international*. 2003;45(1):68–73.
12. Vargas S, Camilli G. A meta-analysis of research on sensory integration treatment. *The American Journal of Occupational Therapy*. 1999;53(2):189–98.
13. Schaaf RC, Miller LJ. Occupational therapy using a sensory integrative approach for children with developmental disabilities. *Mental retardation and developmental disabilities research reviews*. 2005;11(2):143–8.
14. Humphries T, Wright M, McDougall B, Vertes J. The efficacy of sensory integration therapy for children with learning disability. *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics*. 1990;10(3):1–17.