

Effects of Timing Training on Stuttering Severity and Motor Timing in Children Who Stutter

Derakhshani MH¹, *Nezakat Al-hosseini M², Shafiei B³, Nikkhah S⁴

Author Address

1. MA, Department of Sports sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran;

2. Associate Professor, Department of Sports sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran;

3. Assistant Professor, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Medical University of Isfahan, Isfahan, Iran;

4. MSc, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Medical University of Isfahan, Isfahan, Iran.

*Corresponding Author E-mail: mnezakat2003@yahoo.com

Received: 2019 January 17 ; Accepted: 2019 May 7

Abstract

Background & Objectives: Stuttering is caused by the destruction of spatial and temporal control of the movements necessary to produce speech fluently. People who stutter act differently in control of the variability, speed and timing of speech movements at the time of speaking fluently. Physiological evidence suggests that the mechanisms of motor control for speech production and limb movements have the same nervous structures. Accordingly, in the present study, the researchers decided to use a motor timing intervention program assuming that by practicing this task, people who stutter can get the timing or ability to synchronize themselves with each move or the ability to accurately repeat the motor task with the rhythm. In addition, with the help of intrinsic (or emergent) timing processes, they can also transfer this probable improvement of timing stability during the implementation of motor tasks assignments to oral-motor tasks.

Methods: A quasi-experimental study with a pre-test post-test design was conducted on 14 children (10 boys and 4 girls) ranged between 4-6 years of age. The participants were recruited conveniently and assigned randomly to two groups of experimental and control. The experimental group underwent an eight-week sequential motor timing training. The Audacity and Stuttering Severity Instrument-Fourth Edition tests were used in order to measure the stuttering severity and motor timing, respectively. The data were analyzed using the covariance analysis.

Results: Analysis of covariance showed that by controlling the effect of pre-test, there was a significant difference between the mean scores of motor timing and the stuttering severity of children in both groups, and the average scores of motor timing ($p < 0.001$) and stuttering severity ($p = 0.018$) in the experimental group were significantly lower than the control group.

Conclusion: Based on the findings of this study, timing training improved mental timing and, as a result, stuttering severity decreased in children who stutter. In these children, speech and non-speech movements control processes had the same nervous structure. Weakness in the speech and non-speech abilities of people who stutter may therefore be due to defect in the timing mechanisms and impact of timing training on the mental timing or in fact same intrinsic (or emergent) timing processes improved the speech and reducing stuttering severity in these children.

Keywords: Timing training, Stuttering severity, Stuttering.

اثر تمرینات زمان‌بندی بر شدت لکت و زمان‌بندی حرکتی کودکان مبتلا به لکت

محمدحسین درخشانی^۱، *مریم نزاکت‌الحسینی^۲، بیژن شفیع‌ی^۳، سپیده نیکخواه^۴

توضیحات نویسندگان

۱. کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران؛
 ۲. انتشار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران؛
 ۳. استادیار، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران؛
 ۴. کارشناس ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.
- * رابایانامه نویسنده مسئول: mnezakat2003@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۲۷ دی ۱۳۹۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

چکیده

زمینه و هدف: لکت در اثر تخریب کنترل فضایی و زمانی حرکات لازم جهت تولید روان‌گفتار به وجود می‌آید. افرادی که لکت دارند، در کنترل تغییرپذیری، سرعت و زمان بندی نسبی حرکات گفتاری خود در موقع صحبت کردن روان، متفاوت عمل می‌کنند. شواهد فیزیولوژیکی نشان دادند که ساز و کارهای کنترل حرکتی برای تولید گفتار و حرکت اندام‌ها زیر بنای عصبی مشترکی دارند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرینات زمان‌بندی بر زمان‌بندی حرکتی و شدت لکت کودکان مبتلا به لکت بوده است.

روش بررسی: این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق چهارده کودک شهر اصفهان (ده پسر و چهار دختر) با محدوده سنی ۴ تا ۶ سال بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات زمان‌بندی را انجام داد. از آزمون‌های شدت لکت و آداسیتی به ترتیب جهت سنجش شدت لکت و زمان‌بندی حرکتی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که پس از هشت هفته تمرینات زمان‌بندی، شدت لکت ($p=0/018$) و زمان‌بندی حرکتی کودکان ($p<0/001$) گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معناداری بهبود یافته است.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد ارتباط قوی میان سیستم‌های زبانی و حرکتی وجود داشته و تمرینات زمان‌بندی ممکن است روش تمرینی مفیدی برای کاهش شدت لکت در کودکان مبتلا به لکت باشد.

کلیدواژه‌ها: تمرین زمان‌بندی، شدت لکت، لکت زبان.

لکنت، اختلالی است که منجر به ازکارافتادگی سیستم حرکتی-کلامی می‌شود. اکثر نظریه‌ها، مجموعه‌ای از عوامل ژنتیکی و زبان‌شناسی و روانی اجتماعی را علت لکنت می‌دانند (۱). توانایی نداشتن سیستم گفتاری در تولید و ارسال دستورعمل‌های حرکتی به عضلات مربوط به تولید گفتار منجر به ایجاد لکنت می‌شود که در نهایت فرد توانایی صحبت کردن به صورت روان را از دست می‌دهد. به طور خلاصه روان نبودن گفتار و وقفه در تولید گفتار در کودکان و بزرگسالان، لکنت نامیده می‌شود. لکنت در اثر تخریب کنترل فضایی و زمانی حرکات لازم جهت تولید روان گفتار به وجود می‌آید. افرادی که لکنت دارند، در کنترل تغییرپذیری و سرعت و زمان بندی نسبی حرکات گفتاری خود در موقع صحبت کردن روان، متفاوت عمل می‌کنند (۲ و ۳). مطالعات حاکی از آن است که مشکلاتی در زمان بندی و هماهنگی سیستم کنترل گفتار در افراد مبتلا به لکنت وجود دارد و این عامل را علت اصلی رشد لکنت می‌دانند (۲). بسیاری از محققان معتقدند در افراد مبتلا به لکنت نارسایی حرکتی عمومی یا به طور اختصاصی‌تر، مشکلی در زمان بندی وجود دارد که عاملی برای رشد و باقی ماندن این اختلال است (۱). فرانتس و همکاران (۴) مدارک بیشتری برای تأیید وجود وقت‌نگهدار مرکزی به عنوان فرآیندی مشترک فراهم کردند. آن‌ها نشان دادند که پایداری زمان بندی در هنگام استفاده از سیستم‌های حرکتی-دهانی و حرکتی-دستی وجود دارد. برطبق این نتایج به نظر می‌رسد فرآیندهای عصبی مشترکی در زمان بندی کلامی و دستی وجود داشته باشد. براساس این فرضیه ممکن است پردازش زمانی درونی مثل ساعتی درونی به طور مشترک در سیستم‌های حرکتی مختلف موجود باشد. تصور می‌شود که افراد مبتلا به لکنت دارای ضعفی عمومی در این فرآیندهای زمان بندی مرکزی باشند (۴). فرض بر این است که سازوکارهای کنترل حرکتی برای تولید گفتار و تکالیف حرکتی دهانی غیرکلامی و حرکت اندام‌ها، زیربنای عصبی مشترکی دارند؛ بنابراین، نقص در سیستم حرکتی گفتار بر سایر سیستم‌ها (به عنوان مثال، در تکالیف مربوط به حرکت اندام‌ها یا تکالیف حرکتی دهانی غیرکلامی) اثر می‌گذارد (۲، ۳).

مطالعات تصویربرداری عصبی نشان می‌دهند که در هنگام حرکت و تولید گفتار، مناطق مشابهی از مغز فعال می‌شوند. بینکوفسکی و بوچینو (۵) فعالیتی در منطقه بروکا در هنگام تولید گفتار و حرکات پیچیده دست مشاهده کردند. همچنین، افزایش جریان خون به منطقه بروکا در هنگام تکلیف چنگ زدن دیده شده است. به علاوه ناحیه‌ای در نزدیکی منطقه بروکا شناخته شده است که در موقع انجام حرکات ریتمیک دهان و حرکات اندام‌ها فعال می‌شود (۶). اسمیت و همکاران (۷) دریافتند، هنگامی که شرکت‌کنندگان هم‌زمان با صحبت کردن، تکلیف ضربه زدن با انگشت را انجام می‌دهند، سرعت و دامنه حرکت این دو فعالیت به طور خودکار هماهنگ می‌شود. علاوه بر این، مطالعات دیگر بر روی شرکت‌کنندگانی که به صورت نرمال صحبت می‌کردند، نشان داد که زمان بندی درون فردی و تغییرپذیری و دقت، در حرکات ریتمیک گفتاری و غیرگفتاری مشابه است (۶، ۷). اندازه‌گیری زمان بندی گفتار و تولید صدایی و ضربه زدن با انگشت دست و پا نشان

می‌دهد که بین حرکات مشابه در اندام‌های متفاوت ارتباط مثبت وجود دارد (برای مثال حرکات اندام‌های بدن یا تکالیف حرکتی دهانی غیرکلامی) (۸). این یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند افراد مکانیسم‌های زمان بندی مشترکی دارند که در موقع انجام تکالیف حرکتی ریتمیک مختلف از آن استفاده می‌نمایند (۲). این موضوع می‌تواند تا حدودی توضیحی بر وجود منابع عصبی مشترک در سیستم‌های حرکتی باشد (۸). مدارکی درباره وجود این تشابهات زمان بندی در اندام‌ها و تکالیف گفتاری در افراد با لکنت نیز به دست آمده است (۲).

ممکن است نقص حرکتی گفتاری که در لکنت مشاهده می‌شود، به حوزه حرکتی غیرکلامی نیز منتقل شود (۳). کوپر و آلن (۸) نشان دادند، کودکانی که در تکلیف زمان بندی ضربه زدن با انگشت در مقایسه با کودکان دیگر بهتر هستند، در تکلیف زمان بندی تکرارکردن جمله نیز بهتر عمل می‌کنند و این همبستگی در کودکان دارای لکنت بسیار بیشتر از کودکان عادی است. با توجه به این استدلال، به نظر می‌رسد نارسایی حرکتی عمومی در مبتلایان به اختلال لکنت وجود داشته باشد که این نارسایی، حرکات دهانی غیرکلامی و حرکات اندام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محققانی که نقص زمان بندی کلی را در لکنت گزارش داده‌اند، نشان می‌دهند که بزرگسالان مبتلا به لکنت در زمان بندی گفتار دارای آهنگ و بدون آهنگ و تکالیف حرکتی دهانی غیرکلامی و تکلیف ضربه زدن با انگشت که در آن‌ها مهارت‌های زمان بندی با توانایی همگام‌سازی با هر ضربه یا توانایی تکرار دقیق یک ریتم مشخص شده، ضعیف عمل می‌کنند (۲). چانگ و همکاران (۹) فرض کردند که سازوکارهای عصبی برای برنامه‌ریزی و اجرای حرکات اندام‌های هجای با اهداف شنوایی، در بزرگسالان با لکنت و عادی در طی انجام حرکات گفتاری و غیرگفتاری مشترک است. آن‌ها با استفاده از تصویربرداری الکترومغناطیسی کارکردی، الگوهای فعال‌سازی مغز را در ناحیه قشر پیش حرکتی و ناحیه گیجگاهی آهیانه‌ای بررسی کردند و دریافتند که افراد مبتلا به لکنت الگوهای مختلف فعال‌سازی را در یکپارچه‌سازی ادراکی و نیز در برنامه‌ریزی و اجرای تولید کلام در تکالیف گفتاری و غیرگفتاری، نشان می‌دهند. الگوهای فعال‌شدن در دو گروه لکنت و کنترل تفاوت داشت؛ اما در درون هر گروه، الگوی فعال‌شدن در تکالیف گفتاری و غیرگفتاری همسان بود که از فرضیه بنیادی سیستم کنترل عصبی مشترک حمایت می‌کند.

در مطالعه اخیری (۱۰) با استفاده از تحریک الکتریکی موضعی قشر پیش حرکتی جانبی-خلفی، افراد شرکت‌کننده باید با انگشت اشاره دست راست تکلیف ضربه زدن را هماهنگ با مترونوم انجام می‌دادند. محققان مشکلات زمان بندی را در چهارده بزرگسال مبتلا به لکنت پس از تحریک سمت راست این منطقه گزارش کردند. در مقابل طبق انتظار، در افراد عادی مشکلات زمان بندی پس از تحریک سمت چپ ناحیه مذکور ظاهر شد. این یافته وجود نواحی مغزی متفاوت یا غیرمعمول را برای کنترل زمان بندی حرکات غیرگفتاری در افراد مبتلا به لکنت تأیید می‌کند (۱۰).

شواهد تحقیقی دیگری نیز نقص هماهنگی عمومی را در افراد مبتلا به لکنت نشان می‌دهد. این ضعف با تغییرپذیری بیشتری در توالی چند حرکتی لب و فک و حرکت انگشتان در هنگام انجام تکالیفی مانند

دقت در چرخاندن محور و سرعت حرکت فلکشن و دقت توالی ضربه زدن با انگشت مشاهده شده است (۱۱).

بنابراین در تحقیقات مختلف که از روش‌های سنجش گوناگون از جمله تصویربرداری عصبی برای بررسی الگوهای فعال‌سازی عصبی استفاده کردند، مشخص شد که تفاوت‌های حرکتی در افراد مبتلا به لکنت فقط محدود به تولید گفتار نیست و در هنگام اجرای تکالیف دیگر نیز دیده می‌شود (۳). در برخی از تحقیقات ضعف در کنترل زمان‌بندی در هنگام اجرای تکالیف حرکتی به‌ویژه تکالیفی با سرعت زیاد یا تکالیف نیازمند به حرکت از ریتمی به ریتم دیگر، بیشتر گزارش شده است (۱۲)؛ بنابراین به نظر می‌رسد نقص حرکتی گفتاری که در لکنت مشاهده می‌شود، به حوزه حرکتی غیرکلامی نیز انتقال‌پذیر است.

گزارشات زیادی از هم‌زمانی اختلالات زبانی-شناختی و اختلالات حرکتی وجود دارد. شواهد عصب‌فیزیولوژیکی مشخص می‌کند که از یک سو مناطق مغزی مربوط به کارکردهای زبانی هنگام انجام تکالیف حرکتی فعال هستند و از سوی دیگر هنگام انجام تکالیف زبانی، مناطق حرکتی مغز نیز فعال می‌شوند (۲)؛ این مطلب نشان می‌دهد سازوکارهای کنترل حرکتی برای تولید گفتار و حرکت اندام‌ها زیربنای عصبی مشترکی دارند (۲،۳). بر این اساس در تحقیق حاضر محققان بر آن شدند تا از یک برنامه مداخله زمان‌بندی استفاده کنند؛ با این فرض که ممکن است با انجام این دوره تمرینات افراد بتوانند زمان‌بندی یا توانایی همگام‌سازی با هر حرکت یا توانایی تکرار دقیق حرکت همراه با ریتم را کسب کنند و با کمک یک پردازشگر زمانی درونی (۲) بتوانند این بهبود احتمالی پایداری زمان‌بندی در هنگام اجرای تکالیف حرکتی را به تکالیف حرکتی-دانه‌نی نیز انتقال بدهند؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات زمان‌بندی بر زمان‌بندی حرکتی و شدت لکنت کودکان مبتلا به لکنت بود.

۲ روش بررسی

تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی و به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از یک‌گروه کنترل بود. جامعه مطالعه شده را تمامی کودکان مبتلا به لکنت در دامنه سنی ۴ تا ۶ سال، مراجعه‌کننده به سه مرکز گفتاردرمانی در شهر اصفهان تشکیل دادند. از این میان چهارده نفر از کودکان دختر و پسر با شدت لکنت متوسط تا خفیف که شش ماه از زمان لکنت آن‌ها گذشته بود، به‌صورت در دسترس انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل (هفت نفر) و آزمایش (هفت نفر) قرار گرفتند. شرایط ورود کودکان به آزمایش شامل ابتلا به لکنت (با شدت متوسط تا خفیف)، دامنه سنی ۴ تا ۶ سال، حس بینایی و شنوایی سالم و بهره‌های هوشی نرمال، وجود نداشتن اختلال خاص، بیماری‌های عصبی و تأخیر حرکتی، اختلالات همبود (بیش‌فعالی و غیره) و مصرف نکردن داروی خاصی بود. شرایط خروج نیز شامل شرکت نداشتن منظم در تمرینات و تکمیل نکردن آزمون‌های تحقیق و مصرف داروهای خاص با عوارض حرکتی و شناختی در حین تحقیق بود.

قبل از اجرای تمرینات، کودکان هر دو گروه موافقت کتبی خود را طی رضایت‌نامه‌ای اعلام کردند. گروه کنترل فقط در درمان استاندارد لیدکامپ^۱ گفتاردرمانی شرکت کرد؛ اما گروه آزمایش علاوه بر درمان استاندارد لیدکامپ، تمرینات زمان‌بندی را به مدت هشت هفته و هر هفته دو جلسه انجام داد.

قبل از شروع تمرینات در مرحله پیش‌آزمون، با استفاده از ابزار سنجش شدت لکنت^۲ (SSI4) و آداسیتی^۳ به ترتیب مقادیر شدت لکنت و زمان‌بندی حرکتی آزمودنی‌ها بررسی شد. جلسات تمرین در اتاقی آرام و آگوستیک انجام پذیرفت. مدت زمان هر جلسه تمرین حداکثر پانزده دقیقه برای هر کودک بود. در جلسات تمرین از شرکت‌کننده خواسته شد به صدای مترونوم گوش دهد و هماهنگ با ضربات مترونوم تکالیف مختلف ضربه‌زدن را با دست برتر و غیربرتر و با پای برتر و غیربرتر اجرا کند (۱۳) (جدول ۱). پس از هشت هفته مداخله، در مرحله پس‌آزمون دوباره آزمون‌های مذکور گرفته شد.

آزمون شدت لکنت (۱۴) به سنجش ابعاد رفتاری لکنت (فراوانی و دیرش و رفتارهای فیزیکی) می‌پردازد. فراوانی با درصد هجاهای لکنت‌شده مشخص می‌گردد و به نمره ۲ تا ۱۸ تبدیل می‌شود. دیرش شامل میانگین سه تا از وقایع طولانی‌تر لکنت است که از ۴ تا ۱۸ نمره‌دهی می‌شود. رفتارهای فیزیکی همراه، در چهار طبقه بررسی خواهد شد و هر طبقه از ۰ تا ۵ نمره‌دهی می‌شود. نمره مجموعه (رفتارهای فیزیکی) این طبقات ۰ تا ۲۰ است. نمره کل آزمون شدت لکنت از مجموع سه زیرمجموعه (فراوانی و دیرش و رفتارهای فیزیکی) به دست می‌آید.

در قسمت فراوانی، گفتاردرمانگر از شرکت‌کننده می‌خواهد سه جمله را که حداقل دارای ۵۰ هجا است، بیان کند. بعد از اینکه شرکت‌کننده جملات را بیان کرد، تعداد هجاهایی که در هنگام بیان جملات، دچار لکنت شده بود توسط گفتاردرمانگر شمرده می‌شود. درصد فراوانی لکنت از مجموع هجاهای لکنت‌شده تقسیم بر کل تعداد هجاها ضرب در ۱۰۰ به دست می‌آید. سپس با توجه به فرم استاندارد SSI4 و جدول مربوط به درصد فراوانی لکنت، نمره مربوط به فراوانی محاسبه می‌شود. در قسمت دیرش، گفتاردرمانگر میانگین طول سه تا از رخداد‌های بسیار طولانی لکنت را با دقت ۰/۱ ثانیه اندازه‌گیری می‌کند. با توجه به فرم استاندارد SSI4 و جدول مربوط به دیرش، گفتاردرمانگر براساس مدت زمان میانگین سه تا از رخداد‌های بسیار طولانی لکنت، نمره مربوط به آن را با توجه به جدول محاسبه می‌کند.

در قسمت علائم فیزیکی همراه، شش مقیاس وجود دارد: ۰=هیچ؛ ۱=درخور توجه نیست مگر اینکه جست‌وجو شود؛ ۲=به‌سختی به چشم مشاهده‌گری عادی نمایان است؛ ۳=آشفته‌کننده؛ ۴=بسیار آشفته‌کننده؛ ۵=ظاهر دردناک و شدید. هم‌زمان که شرکت‌کننده در حال بیان جملات است، گفتاردرمانگر حالات شرکت‌کننده (مانند ۱. صدای آشفته‌کننده مثل تنفس صدادار، ۲. شکلک‌های چهره‌ای مثل حرکت سریع فک، ۳. حرکت سر مثل به‌سمت عقب یا جلو، ۴. حرکت اندام‌های انتهایی مثل حرکت دست و بازو) را بررسی می‌کند و براساس

3. Audacity

1. Lidcombe program

2. Stuttering Severity Instrument-Fourth Edition

اندازه‌گیری سرعت یا اندازه‌گیری فاصله زمانی به‌کار می‌رود. در تحقیق حاضر از این نرم‌افزار به‌منظور اندازه‌گیری زمان‌بندی حرکتی استفاده شد. به این ترتیب که کودکان مبتلا به لکنت به صدای مترونوم گوش دادند و سعی کردند هم‌زمان با مترونوم تکلیف ضربه‌زدن با بلز (اسباب‌بازی که تولید صدا می‌کند) را به‌صورت هماهنگ انجام دهند. سپس این نرم‌افزار صدای مترونوم و صدای بلز را به‌طور هم‌زمان ثبت کرد و با محاسبه فاصله زمانی بین صدای مترونوم و صدای ضربه‌زدن، دقت زمان‌بندی را براساس هزارم ثانیه اندازه‌گیری نمود. هوجیکو (۱۸) برای اندازه‌گیری فاصله زمانی بین دو برخورد توپ تنیس با میز، نرم‌افزار آداسیتی را به‌کار برد. همچنین در تحقیق دیگری مورادگلو و همکاران (۱۹) جهت اندازه‌گیری فاصله زمانی برخورد کره‌ها باهم (کره‌ها به‌صورت پاندولی به‌هم برخورد کردند) از این نرم‌افزار استفاده نمودند. این نرم‌افزار با ضبط صدای مربوط به خوردن دو کره به‌هم که منجر به تولید صدا شده، فاصله زمانی هر برخورد را محاسبه کرد. همچنین الیور و همکاران (۲۰) به بررسی هم‌زمان جنبه‌های شناختی و حرکتی تکلیف زمان‌بندی در کودکان فلج مغزی پرداختند. در این تحقیق نیز برای اندازه‌گیری زمان‌بندی توالی‌های موسیقی و بیان کلامی، به‌صورت مستقیم از نرم‌افزار آداسیتی استفاده شد.

آن به شرکت‌کننده نمره می‌دهد. در آخر گفتاردرمان با جمع سه نمره (فراوانی+دیرش+علائم فیزیکی همراه) نمره کل شدت لکنت فرد را محاسبه می‌کند.

پایایی آزمون نسخه فارسی توسط ذوالفقاری و همکاران سنجیده شد. پایایی آزمون در حالت میان آزمونگر برای هر بخش از آزمون، ۰/۹۸ تا ۰/۹۴ بود. پایایی درون آزمونگر (اجرای مجدد آزمون) برای هر بخش، ۰/۹۸ تا ۰/۹۲ نشان داده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون ۸۷٪ بود (۱۵). رایی این ابزار را بر روی ۷۲ کودک مبتلا به لکنت اجرا کرد. درصد توافق در حالت میان آزمونگر برای هر بخش از ۸۲/۹ تا ۹۶/۴ گزارش شده است (۱۴، ۱۶).

نرم‌افزار آداسیتی توسط دومینیک مازونی و راجر داننبرگ در پاییز ۱۹۹۹ در دانشگاه کارنگی ملون ساخته شد (۱۷). این نرم‌افزار در ماه مه سال ۲۰۰۰ به‌عنوان نرم‌افزار رایگان منتشر شد. نرم‌افزار مذکور به‌لحاظ آماری توسط گروه آداسیتی توسعه یافته است. این نرم‌افزار قادر به تولید انواع صدا و نویز یا ریتم‌های مختلف است. همچنین نرم‌افزار آداسیتی جهت ضبط و ویرایش صدا استفاده می‌شود. این نرم‌افزار برای ضبط صدای زنده از طریق میکروفون یا میکسر، برای ویرایش فایل‌های صوتی، برش، ترکیب‌کردن، کپی‌کردن یا ترکیب صداها باهم و برای

جدول ۱. پروتکل تمرینات زمان‌بندی

نوع تمرین و اسباب‌بازی	تعداد کوشش‌ها در یک جلسه	تعداد ضربه‌ها در یک کوشش	فاصله بین ضربه‌ها	تعداد ضربات همراه با مترونوم	زمان استراحت بین هر کوشش	کل زمان جلسه برای هر کودک
ضربه‌زدن با یک‌دست	۵الی۶ بار	۳۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۳۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
ضربه‌زدن با یک‌دست روی ران پا	۵الی۶ بار	۳۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۳۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
ضربه‌زدن با نوک انگشتان پا	۵الی۶ بار	۳۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۳۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
ضربه‌زدن با نوک انگشتان پا به‌صورت متناوب	۵الی۶ بار	۳۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۳۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
ضربه‌زدن با پاشنه پا	۵الی۶ بار	۳۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۳۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
ضربه‌زدن با پاشنه پا به‌صورت متناوب	۵الی۶ بار	۳۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۳۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
ترکیب حرکت دست و پا	۵الی۶ بار	۳۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۳۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
سنج	۵الی۶ بار	۱۵الی۲۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۱۵الی۲۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
پیانو فرشی	۵الی۶ بار	۱۵الی۲۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۱۵الی۲۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
پیانو دستی	۵الی۶ بار	۱۵الی۲۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۱۵الی۲۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه
ست درامر چوبی	۵الی۶ بار	۱۵الی۲۰ ضربه	۱۰۰۰ میلی‌ثانیه	۱۵الی۲۰ ضربه	۲۰الی۳۰ ثانیه	۸ دقیقه

۳ یافته‌ها

به‌منظور بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای ارزیابی همگنی واریانس‌ها از آزمون لوین و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتیجه این آزمون‌ها نشان داد که تمامی پیش‌فرض‌های آزمون تحلیل کوواریانس برقرار است. برای همه فرضیه‌ها سطح معناداری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. نتایج آنالیز کوواریانس در جدول ۲ ارائه شده است.

به‌منظور بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای ارزیابی همگنی واریانس‌ها از آزمون لوین و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتیجه این آزمون‌ها

جدول ۲. شاخص‌های توصیفی متغیرهای زمان‌بندی حرکتی و شدت لکت در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به‌تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به‌همراه نتایج آنالیز کوواریانس

متغیر	گروه	پیش‌آزمون		پس‌آزمون		مقایسه پس‌آزمون	
		میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	مقدار F	مقدار p
زمان‌بندی حرکتی	آزمایش	۰/۳۶	۰/۱۰	۰/۱۴	۰/۰۴	۱۸/۴۸۲	<۰/۰۰۱
	کنترل	۰/۳۲	۰/۰۹	۰/۲۹	۰/۰۸		
شدت لکت	آزمایش	۲۱/۵۷	۹/۲۷	۱۷/۱۴	۱۰/۷۶	۷/۷۳۳	۰/۰۱۸
	کنترل	۱۹/۵۷	۶/۸۵	۱۸/۱۴	۶/۵۷		

براساس جدول ۲، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که با کنترل اثر پیش‌آزمون تفاوت معناداری بین نمرات زمان‌بندی حرکتی ($p < ۰/۰۰۱$) و شدت لکت ($p = ۰/۰۱۸$) کودکان دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده می‌شود و میانگین امتیازات زمان‌بندی حرکتی در گروه آزمایش به‌طور معناداری در مقایسه با گروه کنترل کمتر است؛ همچنین میانگین نمرات شدت لکت در گروه آزمایش به‌طور معناداری در مقایسه با گروه کنترل کمتر بوده است.

۴ بحث

در اختلالی مانند لکت، سیستم حرکتی گفتار قادر به تولید یا ارسال دستورات حرکتی برای صحبت کردن روان نیست؛ بنابراین افراد مبتلا به لکت با ضعف کنترل زمانی و مکانی برای تولید گفتار روان مواجه هستند. براساس یافته‌های تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین امتیازات زمان‌بندی حرکتی و شدت لکت کودکان در دو گروه تجربی و کنترل مشاهده شده و میانگین امتیازات زمان‌بندی حرکتی و شدت لکت در گروه تجربی به‌طور معناداری در مقایسه با گروه کنترل کمتر بوده است. به‌نظر می‌رسد تمرینات زمان‌بندی حرکتی بر زمان‌بندی حرکتی و کاهش شدت لکت کودکان مبتلا به لکت اثر داشته است. این نتایج با تحقیق فرانتس و همکاران (۴)، اسمیت و همکاران (۷)، اولاندر و همکاران (۲)، پکمن (۲۱)، فلانگا (۲۲) و ایچل و همکاران (۲۳) همسوست. این مطالعات نقص در هماهنگی و زمان‌بندی حرکتی را در سیستم‌های کنترل زبان در افراد مبتلا به لکت نشان می‌دهند.

مطالعات حاکی از آن است که زمان‌بندی و هماهنگی سیستم کنترل گفتار در افراد مبتلا به لکت دارای مشکلاتی است (۲). فرانتس و همکاران (۲۴) نشان دادند که پایداری زمان‌بندی (سیستم وقت‌نگه‌دار مرکزی) در هنگام استفاده از سیستم‌های حرکتی-دهانی و حرکتی-دستی وجود دارد. براساس این فرضیه ممکن است پردازش زمانی درونی مثل ساعتی درونی به‌طور مشترک در سیستم‌های حرکتی مختلف موجود باشد. تصور می‌شود که ضعفی عمومی در این فرآیندهای زمان‌بندی مرکزی در افراد مبتلا به لکت زبان وجود دارد (۴).

علاوه بر این مطالعات تجزیه و تحلیل گفتار افراد مبتلا به لکت مشخص کرد که این افراد در بیان هجاها نقضی در زمان‌بندی لب و فک از خود نشان می‌دهند (۳، ۲۳). همچنین اولاندر و همکاران (۲) در تحقیقی دریافتند که کودکان مبتلا به لکت در زمان‌بندی دچار مشکل هستند.

درحقیقت کودکان مبتلا به لکت مشکل اساسی در سیستم عصبی خود دارند که در توانایی انجام تکالیف ریتمیک و زمان‌بندی دارای مشکل هستند. پکمن (۲۱) وجود ناهنجاری را در مکانیسم زمان‌بندی دلیل اصلی ایجاد لکت زبان می‌داند. در تحقیقی دیگر هیلگر (۳) نشان داد که افراد مبتلا به لکت دقیقاً می‌دانند چه می‌خواهند بگویند و هیچ دشواری در دسترسی به حافظه یا دایره واژگان خود ندارند. آن‌ها تنها با مشکلاتی در زمان‌بندی شروع صحبت و تولید کلمات روبه‌رو هستند. در همین راستا اسمیت و همکاران (۷) با استفاده از یک تکلیف زمان واکنش کلامی به این نتیجه رسیدند که افراد مبتلا به لکت در مقایسه با افراد عادی در شروع حرکات کلامی تأخیر دارند. در نظام حرکتی، فرض بر این بوده که ریشه بنیادی و اساسی اختلال لکت، مکانیسم‌های زمان‌بندی است (۹). فرضیه مذکور با این مشاهده که شخص مبتلا به لکت، ذهنی درگیرتر در گفتار در مقایسه با کودکان بدون لکت داشته، همخوانی دارد. این مسئله در فعالیت‌هایی مثل ادا کردن کلمات، تحلیل واج‌ها، طول گفتار و زمان آغاز صحبت کردن مشهود است (۳).

همچنین فلانگا و همکاران (۲۲) مشخص کردند که ریتم‌ها نقش مهمی در زمان و موسیقی بازی می‌کنند. در واقع آن‌ها نشان دادند، کودکان مبتلا به لکت که از لحاظ هوشی نرمال هستند، ادراکات ریتمیک ضعیفی دارند. آن‌ها اشاره کردند که بین آگاهی واج‌شناسی (خواندن) و مهارت‌های ریتمیک، همبستگی زیادی دیده می‌شود و پیوندی قوی بین مهارت‌های زمانی و توانایی‌های واج‌شناختی و خواندن وجود دارد. ایچل و همکاران (۲۳) نیز عنوان کردند که تولید گفتار روان به حرکت‌های دقیق زمانی نیازمند است. درحقیقت آن‌ها بیان داشتند که نقص در شبکه‌های زمان‌بندی مغز یکی از دلایل اصلی عصب‌فیزیولوژیکی لکت است.

برای حمایت بیشتر از این استدلال مطالعه تصویربرداری عصبی توسط چانگ و همکاران (۹) نشان داد که فعالیت عصبی غیرعادی در تکالیف گفتاری در بزرگسالان مبتلا به لکت وجود دارد که به‌صورت مشابه این فعالیت عصبی در تکالیف حرکتی دهانی غیرگفتاری و تکالیف حرکتی نیز دیده می‌شود. فرض بر این است که سازوکارهای کنترل حرکتی برای تولید گفتار و تکالیف حرکتی دهانی غیرکلامی و حرکت اندام‌ها، زیربنای عصبی مشترکی دارند؛ بنابراین، نقص در سیستمی (سیستم حرکتی گفتار) بر سایر سیستم‌ها اثر می‌گذارد (به‌عنوان مثال، در تکالیف مربوط به حرکت اندام‌ها یا تکالیف حرکتی

دهانی غیرکلامی) (۲۰۳). در پژوهش‌های گذشته، هم‌زمان بودن نقص هماهنگی در زمان‌بندی و اختلالات زبانی-شناختی بررسی و روشن شده است که از یک سو مناطق مغزی مربوط به کارکردهای زبانی هنگام انجام تکالیف حرکتی فعال هستند و از طرف دیگر هنگام انجام تکالیف زبانی، مناطق حرکتی مغز نیز فعال می‌شوند (۲)؛ این مطلب نشان می‌دهد مکانیسم‌های کنترل حرکتی برای تولید گفتار و حرکت اندام‌ها زیربنای عصبی مشترکی دارند (۲،۳).

اسمیت و همکاران (۷) دریافتند، هنگامی که شرکت‌کنندگان هم‌زمان با صحبت کردن، تکلیف ضربه‌زدن با انگشت را انجام می‌دهند، سرعت و دامنه حرکت این دو فعالیت به‌طور خودکار هماهنگ می‌شود. فرانتس و همکاران (۴) مشخص کردند که پایداری زمان‌بندی در هنگام استفاده از سیستم‌های حرکتی-دهانی و حرکتی-دستی وجود دارد. همچنین هیلگر (۳) نشان داد که در افراد مبتلا به لکنت، شدت لکنت هنگام انجام هم‌زمان تکلیف صحبت کردن و کشیدن نقاشی بسیار بیشتر از زمانی است که فقط یکی از این دو تکلیف به‌تنهایی انجام می‌شود. مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهند، هنگام انجام تکالیفی که نیازمند استفاده هماهنگ از دو عضو بدن است (مانند انگشتان)، دقت کمی در اجرای کودکان مبتلا به لکنت مشاهده می‌شود (۲). یافته‌ها مشخص می‌کند که بین شدت لکنت و اختلال در حرکت دست همپوشانی وجود دارد. در تحقیق حاضر تمرینات زمان‌بندی حرکتی با استفاده از حرکات دست‌ها انجام شد؛ ممکن است تمرینات زمان‌بندی حرکتی منجر به ارتقای حرکات ریتمیک دست در کودکان مبتلا به لکنت شده و به دلیل وجود ارتباط بین شدت لکنت و حرکات متوالی دست میزان شدت لکنت در کودکان کاهش یافته باشد (۲۰۱۸).

در همین خصوص مطالعات تصویربرداری عصبی نشان دادند که در هنگام حرکت و تولید گفتار، مناطق مشابهی از مغز فعال می‌شوند. بینکوفسکی و بوچینو (۵) فعالیتی در منطقه بروکا در هنگام تولید گفتار و حرکات پیچیده دست مشاهده کردند. همچنین، افزایش جریان خون به منطقه بروکا در هنگام تکلیف چنگ‌زدن دیده شده است (۲۰۱۸). به‌علاوه ناحیه‌ای در نزدیکی منطقه بروکا شناخته شده است که در موقع انجام حرکات ریتمیک دهان و حرکات اندام‌ها فعال می‌شود (۳). باتوجه به این تحقیقات می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمرینات زمان‌بندی حرکتی توانسته است بر سازوکارهای کنترل حرکتی اندام‌ها (دست و پا) تأثیر بگذارد و با ارتقاسازی و کارهای کنترل حرکتی منجر به بهبود زمان‌بندی و به‌دنبال آن کاهش شدت لکنت در کودکان شود.

علاوه بر این تحقیقات نشان داده‌اند که وقتی فرآیند تولید گفتار با فرآیند متوازن (مثل ضرب‌آهنگ مترونوم) همراه گردد، شدت لکنت بسیار کمتر می‌شود (۳). همچنین مشخص شده است که ضعف زمان‌بندی در کودکان و نوجوانانی که از لکنت رنج می‌برند به دلیل ضعف در دقت همگام‌سازی و هماهنگی است. درحقیقت افراد مبتلا به لکنت نه تنها در پیش‌بینی زمان‌بندی بلکه در همگام‌سازی درمقایسه

با کودکان و نوجوانان بدون لکنت ضعیف‌تر عمل می‌کنند؛ لذا این احتمال وجود دارد که تمرینات زمان‌بندی حرکتی توانسته باشد دقت همگام‌سازی را در کودکان مبتلا به لکنت افزایش دهد و از این طریق میزان شدت لکنت را در افراد مبتلا به لکنت کم کند (۲،۳).

در تحقیق حاضر اثر سودمند تمرینات زمان‌بندی بر کاهش شدت لکنت کودکان مشاهده شد. پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی اثر تمرینات مذکور بر سازوکارهای کنترل حرکت دهان و گفتار به‌عنوان عامل میانجی احتمالی در کاهش شدت لکنت در کودکان مبتلا به لکنت بررسی شود.

۵ نتیجه‌گیری

به‌طور خلاصه از آنجاکه به‌نظر می‌رسد کودکان مبتلا به لکنت در برنامه‌ریزی سیستم حرکتی-زبانی خود دچار مشکل باشند و از طرفی در تمرینات زمان‌بندی هر حرکت نیازمند برنامه‌ریزی برای اجرا است و نیز باتوجه به ارتباط سیستم حرکتی با سیستم زبانی و وجود همبستگی بین آن دو، ممکن است تمرینات زمان‌بندی توانسته باشد موجب بهبودی و تقویت سیستم برنامه‌ریزی حرکتی-زبانی شود و از این طریق سرعت حرکت متناوب اندام‌های گفتاری را در کودکان مبتلا به لکنت افزایش داده و منجر به کاهش شدت لکنت شده باشد.

۶ بیانیه‌ها

تأییدیه اخلاقی و رضایت‌نامه از شرکت‌کنندگان:

جهت انجام این پروژه رضایت نامه از شرکت‌کنندگان دریافت شده و پروتکل تحقیق در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه اصفهان تأیید شده است.

در دسترس بودن داده‌ها و مواد:

https://drive.google.com/file/d/1JMjHgCfh1F9JcaNsK_PhRbnwKQYVnrpe/view?usp=sharg

تزاحم منافع:

نویسندگان اعلام می‌دارند تزاحم منافی وجود ندارد.

منابع مالی:

تمامی منابع مالی این تحقیق توسط دانشگاه اصفهان تأمین شده است. مشارکت نویسندگان:

محمد حسین درخشانی جمع‌آوری داده‌ها و نوشتن مقاله را انجام داد. مریم نزاکت الحسینی استاد راهنمای پروژه بوده و مقاله را بررسی و تأیید نمود.

بیژن شفیعی استاد مشاور بوده و بررسی صحت اندازه‌گیری‌های متغیرها را انجام داد.

سپیده نیکخواه شدت لکنت و عملکرد اندام گفتاری را اندازه‌گیری کرد.

۷ تشکر و قدردانی

از مسئولان محترم مرکز گفتاردرمانی ایمان شهر اصفهان و تمامی کودکان عزیز شرکت‌کننده در این پژوهش سپاسگزاری می‌شود.

References

1. Smith A. Stuttering: A unified approach to a multifactorial, dynamic disorder. In: Ratner NB, Healey EC, editors. Stuttering research and practice: Bridging the gap. New York: Psychology Press; 1999. pp: 27-44.
2. Olander L, Smith A, Zelaznik HN. Evidence that a motor timing deficit is a factor in the development of stuttering. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*. 2010;53(4):876-886. doi: [10.1044/1092-4388\(2009/09-0007\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2009/09-0007))
3. Hilger AI, Zelaznik H, Smith A. Evidence that bimanual motor timing performance is not a significant factor in developmental stuttering. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*. 2016;59(4):674-85. doi: [10.1044/2016_JSLHR-S-15-0172](https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-S-15-0172)
4. Franz EA, Zelaznik HN, Smith A. Evidence of common timing processes in the control of manual, orofacial, and speech movements. *Journal of Motor behavior*. 1992;24(3):281-7. doi: [10.1080/00222895.1992.9941623](https://doi.org/10.1080/00222895.1992.9941623)
5. Binkofski F, Buccino G. Motor functions of the Broca's region. *Brain and language*. 2004;89(2):362-9. doi: [10.1016/S0093-934X\(03\)00358-4](https://doi.org/10.1016/S0093-934X(03)00358-4)
6. Bengtsson SL, Ehrsson HH, Forsberg H, Ullén F. Effector-independent voluntary timing: behavioural and neuroimaging evidence. *European Journal of Neuroscience*. 2005;22(12):3255-65. doi: [10.1111/j.1460-9568.2005.04517.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2005.04517.x)
7. Smith A, McFarland DH, Weber CM. Interactions between speech and finger movements: An exploration of the dynamic pattern perspective. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*. 1986;29(4):471-80. doi: [10.1044/jshr.2904.471](https://doi.org/10.1044/jshr.2904.471)
8. Cooper MH, Allen GD. Timing control accuracy in normal speakers and stutterers. *Journal of Speech and Hearing Research*. 1977;20(1):55-71. doi: [10.1044/jshr.2001.55](https://doi.org/10.1044/jshr.2001.55)
9. Chang S-E, Kenney MK, Loucks TM, Ludlow CL. Brain activation abnormalities during speech and non-speech in stuttering speakers. *Neuroimage*. 2009;46(1):201-12. doi: [10.1016/j.neuroimage.2009.01.066](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.01.066)
10. Neef NE, Jung K, Rothkegel H, Pollok B, von Gudenberg AW, Paulus W, et al. Right-shift for non-speech motor processing in adults who stutter. *Cortex*. 2011;47(8):945-54. doi: [10.1016/j.cortex.2010.06.007](https://doi.org/10.1016/j.cortex.2010.06.007)
11. Max L, Caruso AJ, Gracco VL. Kinematic analyses of speech, orofacial nonspeech, and finger movements in stuttering and nonstuttering adults. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*. 2003;46(1):215-32. doi: [10.1044/1092-4388\(2003/017\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2003/017))
12. Zelaznik HN, Smith A, Franz EA. Motor performance of stutterers and nonstutterers on timing and force control tasks. *Journal of Motor Behavior*. 1994;26(4):340-7. doi: [10.1080/00222895.1994.9941690](https://doi.org/10.1080/00222895.1994.9941690)
13. Yu G-H, Lee J-S, Kim S-K, Cha T-H. Effects of interactive metronome training on upper extremity function, ADL and QOL in stroke patients. *NeuroRehabilitation*. 2017;41(1):161-8. doi: [10.3233/NRE-171468](https://doi.org/10.3233/NRE-171468)
14. Riley G. SSI-4 stuttering severity instrument fourth edition. Austin, TX: Pro-Ed. 2009.
15. Zolfaghari M, Shafiei B, Tahmasebi Garmatani N, Ashoorioon V. Reliability of the Persian Version of the Stuttering Severity Instrument-(SSI-4) for Preschool-Age Children. *Middle Eastern Journal of Disability Studies*. 2014;4(2):20-5. [Persian]
16. Davidow JH, Scott KA. Intrajudge and Interjudge Reliability of the Stuttering Severity Instrument-Fourth Edition. *American Journal of Speech-Language Pathology*. 2017;26(4):1105-19. doi: [10.1044/2017_AJSLP-16-0079](https://doi.org/10.1044/2017_AJSLP-16-0079)
17. Free open source cross-platform audio software [Internet]. 2000; Available from: <https://www.audacityteam.org>
18. Hockicko P. Nontraditional approach to studying science and technology. *Communications-Scientific letters of the University of Zilina*. 2010;12(3):66-71.
19. Muradoglu M, Ng EMW, Ng TW. Experimentation on recurrent sphere collision with Audacity. *European Journal of Physics*. 2014;35(6):065017. doi: [10.1088/0143-0807/35/6/065017](https://doi.org/10.1088/0143-0807/35/6/065017)
20. Olivier I, Baker C, Cordier J, Thomann G, Nougier V. Cognitive and motor aspects of a coincidence-timing task in Cerebral Palsy children. *Neuroscience letters*. 2015;602:33-7. doi: [10.1016/j.neulet.2015.06.043](https://doi.org/10.1016/j.neulet.2015.06.043)
21. Packman A. Theory and therapy in stuttering: A complex relationship. *Journal of fluency disorders*. 2012;37(4):225-33. doi: [10.1016/j.jfludis.2012.05.004](https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2012.05.004)
22. Flaunacco E, Lopez L, Terribili C, Zoia S, Buda S, Tilli S, et al. Rhythm perception and production predict reading abilities in developmental dyslexia. *Frontiers in human neuroscience*. 2014;8:392. doi: [10.3389/fnhum.2014.00392](https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00392)
23. Etchell AC, Johnson BW, Sowman PF. Beta oscillations, timing, and stuttering. *Frontiers in human neuroscience*. 2015;8:1036. doi: [10.3389/fnhum.2014.01036](https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.01036)
24. Zelaznik HN, Smith A, Franz EA, Ho M. Differences in bimanual coordination associated with stuttering. *Acta Psychologica*. 1997;96(3):229-43. doi: [10.1016/S0001-6918\(97\)00014-0](https://doi.org/10.1016/S0001-6918(97)00014-0)