

Effect of Rhythmic-Musical Movements on the Theory of Mind in Children with Autism Spectrum Disorder

Navidinejad A¹, *Meshkati Z², Maleki Kh³

Author Address

1. MA in Physical Education, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran;
 2. PhD in Motor Behavior, Associate Professor, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran;
 3. MA in Music, Isfahan University of Applied Sciences, Art, and Culture, Department of Music, Isfahan, Iran.
- *Corresponding Author E-mail: zmeshkati@gmail.com

Received: 2019 February 24; Accepted: 2019 May 29

Abstract

Background & Objectives: Children with autism spectrum disorder (ASD) cannot easily communicate their feelings and thoughts, and experience difficulty with imagining what others think and feel. Studies have indicated that autistic children fail to use theory of mind (TOM). They are unable to understand the mind or others' mental states. As a complementary therapy, music therapy could enhance cognitive, social, perceptual, educational, motor, verbal, and emotional skills of children with ASD. Therefore, the present study aimed to evaluate the effect of rhythmic-musical movements on the ToM in children with ASD.

Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and a control group design. The study participants were 20 7- to 9-year-old children with ASD selected from the Autistic Children Center of Isfahan City, Iran. Moreover, they were randomly divided into an experimental (24 exercise sessions, three 60-min weekly sessions), and a non-intervention control group (n=10). The Gilliam Autism Rating Scale-Second Edition (GARS-2) was used to detect the severity of autism disorder in the studied individuals. This scale has 4 subscales that assess stereotypical behaviors, communication, social interaction, and developmental disorders. Each subscale includes 14 items, i.e., scored from 0 (never) to 3 (always). Finally, the sum of raw scores is converted into standard scores. The reliability of GARS is in the acceptable range. Children obtaining a score of 53-84 in this test were included in this study, as a high functioning autism class. Additionally, the TOM test was used to measure the TOM level in the study subjects. This test has been designed to measure the TOM in healthy children and those with Pervasive Developmental Disorders (PDDs) at the age of 5-12 years. Subscale 1 (social understanding range), subscale 2 (sensitivity & insight), and subscale 3 (emotions & thoughts acceptance) are scored as 0-20, 0-13, and 0-5, respectively. Besides, the total score of the test ranges between 0 and 38. Of the sum-scores of the three subscales, a total score is obtained for the TOM. The greater this score, the higher levels of the TOM the child will achieve. This test has proper reliability and validity. To analyze the collected data, one-way Analysis of Covariance (ANCOVA) with pretest effect control was implemented. Data analysis was performed using SPSS at a significance level of $p < 0.05$.

Results: The present study results suggested a significant difference between two groups of posttest scores in the TOM score after adjusting the pretest scores [$p < 0.002$, $F = 13.07$, $\text{Eta-squared } (\eta^2) = 0.43$]. Therefore, the implemented exercise program had a positive and significant effect on the TOM in the study participants.

Conclusion: The rhythm and music-based activities applied in this study could be a provocative and entertaining method for children with ASD. Additionally, they could be an effective measure to facilitate and accept the transition to a new learning environment or to expand their social group, leading to increased social communication and awareness. These interventions should be considered by families, the Welfare Organization, exceptional schools, and rehabilitation centers.

Keywords: Theory of mind, Rhythmic exercises, Music, Autism.

تأثیر حرکات ریتمیک- موسیقایی بر تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

آرزو نویدی نژادا^۱، * زهره مشکاتی^۲، خلیل اله ملکی^۳

توضیحات نویسندگان

۱. کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران؛
 ۲. دکتری رفتار حرکتی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران؛
 ۳. کارشناس ارشد موسیقی، دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان، گروه موسیقی، اصفهان، ایران.
 * رایانامه نویسنده مسئول: zmeshkati@gmail.com

تاریخ دریافت: ۵ اسفند ۱۳۹۷؛ تاریخ پذیرش: ۸ خرداد ۱۳۹۸

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر یک دوره تمرینات ریتمیک- موسیقایی بر تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم انجام گرفت. **روش بررسی:** تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. بدین منظور از بین هشتاد کودک مبتلا به اختلال اوتیسم مرکز اوتیسم و دبستان ویژه کودکان اوتیسم شهر اصفهان که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند، بیست نفر با استفاده از مقیاس گارز-۲، به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس به شکل تصادفی و به طور مساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از مداخله برای آزمودنی‌ها آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (۱۹۹۹) اجرا شد. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت ۲۴ جلسه، هفته ای سه جلسه ۶۰ دقیقه‌ای به تمرینات ریتمیک- موسیقایی پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ و سطح معناداری ۰/۰۵ استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان نمره تئوری ذهن کودکان اوتیسم در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش پیدا کرده است ($p=0/02$). **نتیجه‌گیری:** موسیقی به عنوان پدیده‌ای چند وجهی از طریق فعال سازی نوروهای آینه‌ای و ایجاد بار عاطفی توانسته است باعث بهبود تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شود. در حرکات ریتمیک، حرکت به عنوان ابزار روان درمانی برای تقویت ادراک عاطفی، شناختی، اجتماعی و فیزیکی کودک استفاده شده است؛ لذا این مداخلات می‌تواند مدنظر خانواده‌ها، سازمان بهزیستی، مدارس استثنایی و مراکز توانبخشی قرار گیرد. **کلیدواژه‌ها:** تئوری ذهن، تمرینات ریتمیک، موسیقی، اوتیسم.

اختلال طیف اوتیسم، اختلالی رشدی است که با اختلالات در تعامل های متقابل اجتماعی و الگوهای ارتباطی و همچنین رشته های محدود از فعالیت های کلیشه ای و تکراری مشخص می شود (۱). تأثیر این اختلالات بر طیف گسترده ای از فعالیت های زندگی روزانه و عملکرد فرد در موقعیت های مختلف متفاوت است. این افراد در ارتباط و تعامل با دیگران مشکلات فراوانی دارند و به راحتی نمی توانند با احساسات و اندیشه ها ارتباط برقرار کنند، در تصور آنچه دیگران فکر و احساس می کنند دچار مشکل هستند، به سختی دوست پیدا می کنند و حتی با اعضای خانواده خود رابطه ای ندارند (۲). تئوری ذهن، رویکردی است که به طور گسترده برای توضیح ماهیت شناخت اجتماعی و تعاملات اجتماعی و ارتباطات کمک می کند. این تئوری، حالت های ذهنی، اعتقادات، نیت، آرزوها، ادعاها و دانش درباره خود و دیگران است؛ همچنین فهمیدن این مطلب که دیگران، اعتقادات و نیاتی متفاوت از اعتقادات و نیت ما دارند. داشتن تئوری ذهن به فرد اجازه می دهد افکار و آرزوها و نیت را به دیگران نسبت دهد و بتواند اعمال آن ها را پیش بینی یا توصیف کند و نیت آنان را بفهمد (۳). تئوری ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت آمیز است (۴). افراد از لحاظ توانایی تئوری ذهن به درجات مختلف روی پیوستاری قرار دارند. در یک سر پیمو ستار با تئوری ذهن پیشرفته و در سر دیگر آن با نقص در تئوری ذهن مواجه اند (۵). پژوهش ها نشان داده است که کودکان اوتیسم تئوری ذهن را به کار نمی برند. آن ها فاقد درک ذهن یا خواندن ذهن دیگران هستند و مشکلات عمده ای در فهمیدن عقاید دیگران دارند؛ یعنی افراد مبتلا به اختلال اوتیسم نمی توانند متوجه شوند که رفتار دیگران، براساس حالات ذهنی آنهاست و این حالات، باورها و نیاتی درباره اینکه چه کار باید بکنند را در بر می گیرد (۶، ۷). تحقیقات نشان می دهد موسیقی درمانی به عنوان یکی از انواع درمان های طب مکمل منجر به تقویت مهارت های شناختی، اجتماعی، ادراکی، آموزشی، حرکتی، کلامی و عاطفی کودکان مبتلا به اوتیسم می شود (۸). موسیقی و موسیقی درمانی در اکثر مواقع باعث بهبود و افزایش مشارکت پذیری و تعاملات اجتماعی کودک و در نتیجه کمک به بهبود استقلال عملکردی او می شود (۹). فعالیت های موسیقایی و ریتمیک به علت برخورداری از ریتم و ضرب که نقش مهمی در درک زمان دارد، توانایی های ذهنی و حافظه کاری را افزایش می دهد (۱۰). بازی های ریتمیک افزون بر اینکه ابزار مؤثری برای آموزش و تمرین مهارت های حرکتی پایه فراهم می کنند، می توانند بر فرایندهای شناختی، توجه، ادراک، تمرکز حواس، هماهنگی عصبی-عضلانی و رشد ارتباط های فردی و مهارت های اجتماعی نیز اثرگذار باشند (۱۱). کودکان اوتیسم علاقه وافری به موسیقی و ملودی های دلنشین و جذاب و نیز آهنگ های ریتمیک دارند؛ لذا درمانگر در کار با این گروه کودکان می تواند از حرکت های توأم با موسیقی که ایجاد هیجان

و توجه می کند به عنوان وسیله ای برای رشد دادن افراد در زمینه های شناختی، ادراکی، آموزشی، حرکتی، مهارت های اجتماعی و عاطفی استفاده کند (۷، ۸). پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر حرکات ریتمیک-موسیقایی بر تئوری ذهن دانش آموزان اوتیسم انجام گرفت.

۲ روش بررسی

روش مطالعه حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. شرکت کنندگان در این پژوهش کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با دامنه سنی ۷ تا ۹ سال و عملکرد قوی، از مرکز کودکان اوتیستیک شهر اصفهان بودند که براساس شرایط ورود به پژوهش تعداد ۲۰ نفر از آن ها انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه ده نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. محققان پس از هماهنگی با مدیر مرکز، جلسه ای با حضور والدین کودکان برگزار کردند و اهداف پژوهش و تمامی مراحل اجرای مطالعه را برای والدین توضیح دادند؛ همچنین از آن ها درخواست همکاری کردند. والدینی که تمایل به حضور کودکانشان در جلسات تمرینی داشتند، پس از توجیه کامل، فرم رضایت آگاهانه را جهت حضور در مطالعه امضا کرده و وارد مطالعه شدند.

از مقیاس ارزیابی اوتیسم گیلیام (ویرایش دوم) ^۲ به منظور تشخیص میزان اختلال اوتیسم افراد استفاده شد. گیلیام در سال ۱۹۹۴ تست گارز^۳ را تهیه کرد که برای افراد ۳ تا ۲۲ ساله مناسب است و می تواند توسط والدین و متخصصان در مدرسه یا خانه کامل شود. این مقیاس دارای چهار زیرمقیاس است که رفتارهای کلیشه ای، ارتباط، تعامل اجتماعی و اختلالات رشدی را ارزیابی می کند. هر زیرمقیاس چهارده گویه دارد که از صفر (هیچگاه) تا سه (همیشه) نمره گذاری می شود. در نهایت جمع نمرات خام به نمرات استاندارد تبدیل می گردد. پایایی گارز در دامنه قابل پذیرش قرار دارد. مطالعات انجام شده نمایانگر ضریب آلفای ۰/۹۰ برای رفتارهای کلیشه ای، ۰/۸۹ برای برقراری ارتباط، ۰/۹۳ برای تعاملات اجتماعی و ۰/۸۸ برای اختلالات رشدی است. روایی تست نیز از طریق مقایسه با تست های مختلف تأیید شده است. این ابزار در سال ۱۳۹۰ توسط کارشناسان مرکز اختلال اوتیسم اصفهان هنجاریابی شد و نقطه برش آزمون ۵۲ به دست آمد. پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ در خرده مقیاس های رفتار کلیشه ای، برقراری ارتباط، تعاملات اجتماعی و اختلالات رشدی به ترتیب ۰/۷۴، ۰/۹۲، ۰/۷۳، ۰/۸۰ و در کل ۰/۸۹ به دست آمد (۱۲). کودکانی که از این آزمون نمره ۵۳ تا ۸۴ کسب کردند به عنوان اوتیسم با عملکرد قوی در مطالعه وارد شدند.

به منظور سنجش میزان تئوری ذهن آزمودنی ها از آزمون تئوری ذهن^۴ استرنمن^۵ و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شد. این آزمون جهت سنجش تئوری ذهن در کودکان عادی و مبتلا به اختلال فراگیر رشد در سنین ۵ تا ۱۲ سال طراحی شده است. خرده مقیاس یک (گسترده درک اجتماعی) نمره ای بین ۰ تا ۲۰، خرده مقیاس دو (حساسیت و بینش) نمره ای بین ۰ تا ۱۳، خرده مقیاس سه (پذیرش احساسات و افکار

4. Theory of mind (TOM)

5. Steerneman

2. Gilliam's Autism Rating Scale (GARS-2)

3. GARS

نمره‌ای بین ۰ تا ۵ و در کل آزمون، نمره‌ای بین ۰ تا ۳۸ دارد. از جمع سه خرده‌مقیاس مذکور، نمره‌ای کلی برای تئوری ذهن به دست می‌آید. هر قدر این نمره بیشتر باشد نشان‌دهنده این است که کودک به سطوح بیشتر تئوری ذهن دست یافته است (۱۳). آزمون تئوری ذهن به صورت مصاحبه انجام می‌شود. این آزمون شامل تصاویر و داستان‌هایی بوده است که آزمونگر بعد از ارائه آن‌ها به آزمودنی، سؤالاتی را مطرح می‌کند و نمره آزمودنی‌ها برای هر پاسخ صحیح یک و برای هر پاسخ غلط صفر است. روایی هم‌زمان از طریق همبستگی آزمون تکلیف خانه عروسک‌ها ۰/۸۹ برآورد شده که در سطح ۰/۰۱ معنادار است. ضرایب همبستگی هر سه خرده‌آزمون با نمره کل آزمون معنادار و بین ۰/۸۲ تا ۰/۹۶ متغیر بوده است. پایایی آزمون به وسیله سه روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ و ضرایب اعتبار نمره‌گذاران بررسی شد. پایایی بازآزمایی بین ۰/۷۰ تا ۰/۹۴ متغیر بوده و تمامی ضرایب در سطح ۰/۰۱ معنادار است. ثبات درونی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون و خرده‌آزمون‌های گسترده درک اجتماعی، حساسیت و بینش، پذیرش احساسات و افکار، به ترتیب ۰/۸۶، ۰/۷۲، ۰/۸۰ و ۰/۸۱ به دست آمد. همچنین ضریب پایایی نمره‌گذاران ۰/۹۸ محاسبه شد (۱۳).

تمرینات به مدت ۲۴ جلسه، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت

۶۰ دقیقه در مرکز کودکان اوتیستیک شهر اصفهان اجرا شد. قبل و بعد از دوره تمرینی از تمامی کودکان آزمون تئوری ذهن در موقعیت یکسان و توسط یک آزمونگر متبخر گرفته شد. ده دقیقه اول جلسات به آماده‌شدن و گرم کردن کودکان و پنج دقیقه آخر به سرد کردن آن‌ها اختصاص یافت. زمان تقریبی بدنه اصلی تمرینات ۴۵ دقیقه بود. بدنه اصلی تمرینات حرکات ریتمیک-موسیقایی به این صورت بود که آزمودنی هنگام شنیدن موسیقی متناسب با سرعت و ریتم آن به فعالیت‌ها و بازی‌هایی که آموزش دیده بود، پرداخت. جهت ایجاد جذابیت و تنوع در برنامه، ابزارهای ابتدایی و ساده موسیقی (قاشقک، بلز، چوب‌دستی، سازهای کوبه‌ای، ارگ) و همچنین اشعار کودکانه به کار رفت. تمرینات بدنی توسط یک مربی متخصص در این زمینه به کودکان آموزش داده شد. ابتدا از آن‌ها درخواست گردید به مربی نگاه کرده و حرکت او را اجرا کنند. سپس از آن‌ها خواسته شد متناسب با ریتم موسیقی فعالیت را انجام دهند. تمرینات شامل حرکات بادی پرکاشن (ساززدن با بدن)، دربیبل و ضربه به توپ، حرکات ریتمیک بدنی، راه رفتن به سبک حیوانات و نیز ترکیب این حرکات باهم بود. گروه کنترل در این مدت هیچ‌گونه برنامه تمرینی ریتمیک-موسیقایی نداشت. جدول ۱ مراحل اجرای برنامه تمرینی را به تفصیل نشان می‌دهد.

جدول ۱. پروتکل تمرینات ریتمیک-موسیقایی

جلسات	زمان (دقیقه)	طرح بدنه اصلی تمرین
اول	۴۰	بادی پرکاشن (ساززدن با بدن) همراه با شمارش مربی.
دوم	۴۰	کوبیدن پا با صدای ضرب تمپو.
سوم	۳۵	راه رفتن مانند حیوانات (کند و تند) همراه با صدای قاشقک و بلز.
چهارم	۴۰	آموزش نت‌ها با کمک از ضرب چوب‌دستی.
پنجم	۵۰	دست‌به‌دست کردن توپ با ریتم تمپو.
ششم	۳۰	دست‌زدن با تغییر ریتم آهنگ «توپ سفیدم».
هفتم	۴۰	دربیبل و ضربه به توپ با ریتم آهنگ «توپ سفیدم».
هشتم	۵۰	حرکات متنوع دست و پا با ریتم تمپو.
نهم	۴۵	حرکات متنوع بدنی (نشستن، برخاستن، چرخیدن و...) همراه با صدای ارگ.
دهم	۵۰	حرکات موزون همراه با صدای ارگ.
یازدهم	۴۰	تکرار و ترکیب جلسات ۱ تا ۶.
دوازدهم	۴۰	تکرار و ترکیب جلسات ۱ تا ۶.

۳ یافته‌ها


بررسی‌های مقدماتی برای اطمینان از نبود تخطی از مفروضه‌های نرمال بودن، خطی بودن، همگنی واریانس، همگنی شیب‌های رگرسیون و پایایی اندازه‌گیری متغیر انجام پذیرفت. برای بررسی تأثیر حرکات ریتمیک-موسیقایی بر تئوری ذهن کودکان اوتیسم از آزمون تحلیل کوواریانس یک‌طرفه استفاده شد. در جدول ۲، میانگین و انحراف استاندارد متغیر تئوری ذهن در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به تفکیک گروه‌های تجربی و کنترل به همراه نتایج آنالیز کوواریانس ارائه شده است.

جهت بررسی و تحلیل یافته‌ها ابتدا با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، نتایج داده‌های به دست آمده از متغیرهای پژوهش توصیف شد. سپس پیش‌فرض‌های آماری لازم به منظور استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس، شامل آزمون شاپیروویلیک جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات گروه نمونه در جامعه و آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس‌ها، تحلیل شدند. همچنین، آنالیز کوواریانس یک‌طرفه با کنترل اثر پیش‌آزمون به منظور تحلیل داده‌ها به کار رفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ انجام گرفت. در تمامی آزمون‌ها سطح معناداری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

جدول ۲. شاخص‌های توصیفی متغیر تئوری ذهن در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به همراه نتایج آنالیز کوواریانس

متغیر	گروه	پیش‌آزمون		پس‌آزمون		نتایج آنالیز کوواریانس	
		میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	F مقدار	p مقدار
تئوری ذهن	آزمایش	۲۳/۹	۴/۷	۲۹/۸	۷/۲	۱۳/۰۷	۰/۰۰۲
	کنترل	۲۴/۹	۵/۱	۲۵/۷	۵/۹		۰/۴۳

چنان‌که در جدول ۲ مشاهده می‌شود بعد از تعدیل نمرات پیش‌آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه در نمره‌های پس‌آزمون در نمره تئوری ذهن وجود دارد ($F=13/07, p=0/002, \eta^2=0/43$)؛ لذا



شکل ۱. نمودار خطی تغییرات تئوری ذهن در پیش‌آزمون و پس‌آزمون

می‌توان نتیجه گرفت که برنامه تمرینی به‌کاررفته اثرگذاری مثبت و معناداری بر تئوری ذهن کودکان داشته است. شکل ۱ نمودار خطی تغییرات تئوری ذهن را در پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان می‌دهد. نوروهای آینه‌ای زمانی فعال می‌شوند که فرد عملی هدف‌مند را انجام می‌دهد یا این عمل را در فرد دیگری می‌بیند. انتظار می‌رود فعال‌سازی این نوروها در طی مشاهده رفتار دیگران، به فرد کمک کند که رفتار و وضعیت ذهنی فرد مقابل را درک و تفسیر نماید. در حرکات ریتمیک، حرکت به‌عنوان ابزار روان‌درمانی برای تقویت ادراک عاطفی، شناختی، اجتماعی و فیزیکی فرد استفاده می‌شود که شامل کار در سطح بدن برای افزایش خودشناختی، تمایز خودمختاری، خودآگاهی، تعامل اجتماعی و ارتباطات و کاهش رفتارهای تکراری و ناکارآمد است (۱). فعالیت پایدار مبتنی بر ریتم باعث افزایش توانایی فرد برای انطباق با محیط خود می‌شود (۱۶). تئوری ذهن در قلب روابط اجتماعی قرار دارد. برخی از توانایی‌های شناختی از جمله هوش و ظرفیت پردازش و حافظه بر تئوری ذهن اثر می‌گذارند. حافظه در یادآوری تجارب گذشته به‌منظور قضاوت مقاصد، دارای نقش مؤثری است (۱۸). از آنجاکه بین شناخت و موسیقی ارتباط وجود دارد، آموزش و ادراک موسیقی به‌صورت نظام‌مند در زمینه پردازش حافظه مؤثر است (۱۰). موسیقی از راه تصویرسازی ذهنی، تقویت حافظه را به‌دنبال دارد. از طرفی منقطع‌بودن و ریتمیک‌بودن حرکات موسیقایی، خود نوعی آموزش حرکتی و تعادل عملکردی بوده که برای افراد لذت‌بخش است؛ همین ساختار زمانی موسیقی، شامل صداهای ریتمیک در الگویی پایدار، هماهنگ‌سازی ظریف حرکات بدنی را تسهیل کرده (۱۹) و منجر به پیش‌بینی پاسخ‌های حرکتی می‌گردد که به‌طور تدریجی این الگوها خودکار می‌شود (۲۰). این تغییر درجهت دیدگاه آگاهانه و جسمی

باتوجه به شکل ۱ سطح ابتدایی تئوری ذهن در هر دو گروه نزدیک به هم است. شیب خط گروه تجربی متفاوت از گروه کنترل بوده و اختلاف معنادار دارد. در پس‌آزمون شیب خط در گروه کنترل کمتر است؛ ولی در گروه تجربی بهبود یافته است.

۴ بحث

یکی از مؤلفه‌های مهم شناخت اجتماعی تئوری ذهن است. تئوری ذهن، اصطلاحی خاص برای توصیف توانایی‌های طبیعی انسان جهت درک نشانه‌های اجتماعی و استفاده از این استنباط درباره حالات ذهنی افراد دیگر است. از این بازتابی نه‌تنها برای درک، بلکه برای پیش‌بینی و قضاوت درباره سخنان و رفتارهای اجتماعی دیگران استفاده می‌شود (۱۴). نتیجه پژوهش حاضر نشان داد حرکات ریتمیک-موسیقایی می‌تواند در افزایش تئوری ذهن کودکان دارای اختلال اوتیسم تأثیر معنادار داشته باشد. این یافته با نتایج مطالعات ماسترو و همکاران (۱)، حسین‌خانزاده (۱۵) و تات و همکاران (۱۶) همسوست. افراد مبتلا به اوتیسم، به‌اندازه کافی قادر نیستند تا به محرک‌ها پاسخ مناسب بدهند؛ بنابراین، بیشتر محققان بر این باورند که احساساتشان باید از طریق موسیقی تقویت شود. واکنش‌های مثبت و مؤثر آن‌ها را تشویق به شرکت در فعالیت‌های ادراکی-حرکتی و روابط اجتماعی می‌کند و باعث کاهش رفتارهای کلیشه‌ای در این کودکان می‌شود (۱۵). موسیقی به‌عنوان پدیده‌ای چندوجهی از طریق فعال‌سازی نوروهای آینه‌ای و ایجاد بار عاطفی می‌تواند سبب بهبود تئوری ذهن شود (۱۷).

۶ **تشکر و قدردانی** ممکن است بینش جدیدی در توسعه ارتباطات بین فردی در افراد مبتلا به اوتیسم ایجاد کند. نویسندگان مقاله از مدیران و مسئولان مرکز کودکان اوتیستیک شهر اصفهان و همچنین تمامی کودکان این مرکز و والدینشان تقدیر و تشکر می‌کنند.

۵ **نتیجه‌گیری** فعالیت‌های مبتنی بر ریتم و موسیقی استفاده‌شده در این مطالعه می‌تواند روشی تحریک‌آمیز و سرگرم‌کننده برای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و نیز راهی مؤثر برای تسهیل و پذیرش انتقال به محیط جدید یادگیری یا گسترش گروه اجتماعی آن‌ها باشد که منجر به افزایش ارتباطات و آگاهی اجتماعی می‌شود.

۷ **بیانیه** نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافی باهم ندارند.

References

1. Mastrominico A, Fuchs T, Manders E, Steffinger L, Hirjak D, Sieber M, et al. Effects of Dance Movement Therapy on Adult Patients with Autism Spectrum Disorder: A Randomized Controlled Trial. *Behav Sci*. 2018;8(7):61. doi: [10.3390/bs8070061](https://doi.org/10.3390/bs8070061)
2. Green D, Charman T, Pickles A, Chandler S, Loucas T, Simonoff E, et al. Impairment in movement skills of children with autistic spectrum disorders. *Dev Med Child Neurol*. 2009;51(4):311–6. doi: [10.1111/j.1469-8749.2008.03242.x](https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.03242.x)
3. Heidari T, Sfahmive A, Framarzi S. The comparison theory of mind dimension in autism children and normal children Isfahan city. *Knowledge & Research in Applied Psychology*. 2017;12(45):64–70. [Persian] http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533799_9ed53f39b3a97455c074a955f8e1ad46.pdf
4. Wellman HM, Cross D, Watson J. Meta-analysis of theory-of-mind development: the truth about false belief. *Child Dev*. 2001;72(3):655–84. doi: [10.1111/1467-8624.00304](https://doi.org/10.1111/1467-8624.00304)
5. Pilowsky T, Yirmiya N, Arbelle S, Mozes T. Theory of mind abilities of children with schizophrenia, children with autism, and normally developing children. *Schizophr Res*. 2000;42(2):145–55. doi: [10.1016/s0920-9964\(99\)00101-2](https://doi.org/10.1016/s0920-9964(99)00101-2)
6. Baron-Cohen S. Precursors to a Theory of Mind: Understanding Attention in Others. In: *Natural Theories of Mind: Evolution, Development and Simulation of Everyday Mindreading*. Cambridge: Basil Blackwell; 1991. pp: 233–51.
7. Anagnostou E, Zwaigenbaum L, Szatmari P, Fombonne E, Fernandez BA, Woodbury-Smith M, et al. Autism spectrum disorder: advances in evidence-based practice. *CMAJ*. 2014;186(7):509–19. doi: [10.1503/cmaj.121756](https://doi.org/10.1503/cmaj.121756)
8. Kim J, Wigram T, Gold C. Emotional, motivational and interpersonal responsiveness of children with autism in improvisational music therapy. *Autism*. 2009;13(4):389–409. doi: [10.1177/1362361309105660](https://doi.org/10.1177/1362361309105660)
9. Soltanzadeh S, Shafaroudi N, Beigi MK, Eftekhari S-R. Effect of musical activity on participation of Tehran's 6-12 years old Autistic children in formal & informal activities. *Rehabilitation Medicine*. 2012;1(2):31–35. [Persian] doi: [10.22037/r.m.vi12.4059](https://doi.org/10.22037/r.m.vi12.4059)
10. Karimi LS, Zare H. Ta'asir mousighi bar tavajog paydar koodakan daray ekhtelal naghs tavajog bish fa'ali [Effect of music on permanent attention in children with attention deficit-hyperactivity disorder]. *Research in School and Virtual Learning*. 2013;1(2):26–34. [Persian]
11. Tajdini S, Pirkhaefi A. Effects of learning games on improving communication skills and social rhythmic autistic children of Urmia city. *Studies in Medical Sciences*. 2015;26(4):268–80. [Persian] <http://umj.umsu.ac.ir/article-1-2891-en.pdf>
12. Ahmadi SJ, Safari T, Hemmatiyani M, Khalili Z. Effectiveness of applied behavioral analysis approach on symptoms of autism. *Journal of Research in Behavioural Sciences*. 2012;10(4):292–301. [Persian] <http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/download/403/755>
13. Ghamarani G, Alborzi S, Khayer M. Validity and reliability of the theory of mind test (TOM test) for use in Iran. *J Psy*. 2006;10(2):181–99. [Persian]
14. Honan CA, McDonald S, Gowland A, Fisher A, Randall RK. Deficits in comprehension of speech acts after TBI: The role of theory of mind and executive function. *Brain Lang*. 2015;150:69–79. doi: [10.1016/j.bandl.2015.08.007](https://doi.org/10.1016/j.bandl.2015.08.007)
15. Hossein Khanzadeh AA, Imankhah F. The effect of music therapy along with play therapy on social behaviors and stereotyped behaviors of children with autism. *Practice in Clinical Psychology*. 2017;5(4):251–62. [Persian] doi: [10.29252/nirp.jpccp.5.4.251](https://doi.org/10.29252/nirp.jpccp.5.4.251)
16. Thaut MH, McIntosh GC, Hoemberg V. Neurobiological foundations of neurologic music therapy: rhythmic entrainment and the motor system. *Front Psychol*. 2015;5:1185. doi: [10.3389/fpsyg.2014.01185](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01185)
17. Livingstone SR, Thompson WF. The emergence of music from the Theory of Mind. *Musicae Scientiae*. 2009;13(2_suppl):83–115. doi: [10.1177/1029864909013002061](https://doi.org/10.1177/1029864909013002061)
18. Bright-Paul A, Jarrold C, Wright DB. Theory-of-mind development influences suggestibility and source monitoring. *Dev Psychol*. 2008;44(4):1055–68. doi: [10.1037/0012-1649.44.4.1055](https://doi.org/10.1037/0012-1649.44.4.1055)
19. Paul S, Ramsey D. Music therapy in physical medicine and rehabilitation. *Australian Occupational Therapy Journal*. 2000;47(3):111–8. doi: [10.1046/j.1440-1630.2000.00215.x](https://doi.org/10.1046/j.1440-1630.2000.00215.x)
20. Moradi H, Sohrabi M, Taheri H, Khodashenas E, Movahedi A. The effects of a course of motor activities along with music on the balance, running speed and agility in children with autism. *J Shahrekord Uni Med Sci*. 2018;20(3):29–42. [Persian] <http://journal.skums.ac.ir/article-1-3418-en.pdf>

