

Comparing Physical Activity Levels in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder in Iran in Terms of Gender, Educational Level, Severity of Disorder and Comorbid Disorders

*Salar S¹, Daneshmandi H², Lieberman LJ³, Kashi A⁴, Shafiee Sh⁵

Author Address

1. PhD Candidate, Adapted Physical Education, Faculty of Sport Science, University of Guilan, Rasht, Iran;

2. Professor, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sport Science, University of Guilan, Rasht, Iran;

3. Professor, Department of Adapted Physical Education, Faculty of Kinesiology, Sports Studies and Physical Education, College at Brockport, The State University of New York, New York, United States;

4. Associate Professor, Department of Behavioral Sciences in Sport, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran;

5. Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Sports Science, University of Guilan, Rasht, Iran.

Corresponding Author Email: Sarvin.Salar@yahoo.com

Received: 2022 March 12; Accepted: 2022 April 30

Abstract

Background & Objectives: Autism spectrum disorder (ASD) is a lifetime neurodevelopmental disorder. Children and adolescents with ASD participate less in physical activities than typically developed peers. Participation in physical activities can promote physical health and bring useful experiences in creating and maintaining effective social communication interactions for children and adolescents with ASD. In comparison, a low level of physical activity can lead to the risk of health-related disease. This study compares physical activity levels in children and adolescents with autism spectrum disorder in terms of gender, educational status, severity of disorder, and type of comorbid disorders.

Methods: The method of this present study was descriptive-analytic. The research samples were 370 children and adolescents with autism spectrum disorders ages 8 to 20 years from both genders. The sampling method was a multi-stage cluster. About 63% of participants (n=233) were boys, while 37% of participants (n=137) were girls. According to the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition*, all participants received a clinical diagnosis. According to educational grade, 62.2% of participants were studying in elementary school (230 people), 23.8% in junior high school (88 people), 13.5% in senior high school (50 people), and 1.1% in preschool (4 people). Also, in terms of autism severity, 23.5% of participants had mild autism (87 people), 37.3% moderate autism (138 people), 23.8% severe autism (88 people), 5.9% (22 people) Asperger syndrome, 0.5% Rett syndrome (2 people) and 7.6% other types. For measuring physical activity, the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) (Crocker et al., 1997) and the Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) (Kowlaski et al., 1997) were used. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (the independent t test, 1-way analysis of variance and Scheffé post hoc test) were used to analyze the data. All tests were performed using SPSS version 23 software at a significance level of 0.05.

Results: There was no significant difference between the physical activity level of girls and boys with ASD ($p=0.147$). Significant differences were observed between the amount of physical activity of children and adolescents with ASD according to the level of education ($p<0.001$) and the severity of the disorder ($p<0.001$). However, there was no significant difference between the level of physical activity according to the type of comorbidity disorders ($p=0.057$). There were significant differences in physical activity between elementary school children and junior high school teenagers ($p=0.010$) and between junior high school children and senior high school children ($p=0.049$). There were significant differences in the amount of physical activity between children and adolescents with mild autism disorder and children and adolescents with severe autism disorder ($p=0.036$), Asperger syndrome ($p=0.012$) and Rett syndrome ($p=0.002$), also among children and adolescents with moderate autism disorder with children and adolescents with severe autism ($p=0.031$) and Asperger syndrome ($p=0.006$) and between children and adolescents with severe autism and Asperger syndrome ($p=0.046$).

Conclusion: Based on the study results, the educational level and the severity of the disorder are effective in the amount of physical activity of children and adolescents with ASD. Also, it is suggested that physical activity in higher education grades be given more attention in schools, and appropriate interventions be designed based on this item.

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Physical activity, Comorbid disorder, Children, Severity of disorder.

مقایسه سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم ایران برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی، شدت اختلال و نوع اختلالات همبود

* سروین سالارا^۱، حسن دانشمندی^۲، لورن جی لیبرمن^۳، علی کاشی^۴، شهرام شفیع^۵

توضیحات نویسندگان

۱. دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی (تربیت بدنی سازگاران)، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛
۲. استاد گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛
۳. استاد گروه تربیت بدنی سازگاران، دانشکده حرکت‌شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ایالتی نیویورک- براکهورت، نیویورک، آمریکا؛
۴. دانشیار گروه علوم رفتاری در ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران؛
۵. دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

*وابانامه نویسنده مسئول: Sarvin_Salar@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

چکیده

زمینه و هدف: سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم پایین‌تر از هم‌تایان آنان است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی، شدت اختلال و نوع اختلالات همبود انجام شد.

روش بررسی: روش پژوهش توصیفی تحلیلی بود. نمونه آماری پژوهش را ۳۷۰ کودک و نوجوان با اختلال طیف اتیسم در سنین ۸ تا ۲۰ سال و از هر دو جنسیت تشکیل دادند. شیوه نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. برای سنجش سطح فعالیت بدنی از پرسش‌نامه فعالیت بدنی برای کودکان (کراکر و همکاران، ۱۹۹۷) و پرسش‌نامه فعالیت بدنی برای نوجوانان (کوالسکی و همکاران، ۱۹۹۷) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (آنوا) و آزمون تعقیبی شفه در نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ در سطح معناداری ۰/۰۵ صورت گرفت.

یافته‌ها: تفاوت معناداری میان سطح فعالیت بدنی دختران و پسران با اختلال طیف اتیسم وجود نداشت ($p=0/147$). بین میزان فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با توجه به مقطع تحصیلی ($p<0/001$) و شدت اختلال ($p<0/001$) تفاوت معناداری مشاهده شد؛ اما بین سطح فعالیت بدنی با توجه به نوع اختلالات همبود تفاوت معناداری وجود نداشت ($p=0/057$). بین کودکان ابتدایی با نوجوانان متوسطه دوم ($p=0/010$) و بین کودکان متوسطه اول با کودکان متوسطه دوم ($p=0/049$) در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری وجود داشت. بین کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم خفیف با کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم شدید ($p=0/036$)، اسپرگر ($p=0/012$) و سندرم رت ($p=0/002$)، میان کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم متوسط با کودکان و نوجوانان با اتیسم شدید ($p=0/031$) و اسپرگر ($p=0/006$) و بین کودکان و نوجوانان با اتیسم شدید و اسپرگر ($p=0/046$) در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری وجود داشت.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج مطالعه، مقطع تحصیلی و شدت اختلال در میزان فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: اختلال طیف اتیسم، فعالیت بدنی، اختلال همبود، کودکان، شدت اختلال.

اختلالات طیف اتیسم^۱، اختلالی رشدی-عصبی^۲ است که برحسب مشخصاتی مانند اختلال در روابط اجتماعی متقابل، ارتباطات، رفتارهای محدود و کلیشه‌ای و برقرارنشدن ارتباط چشمی مؤثر شناسایی می‌شود (۱). اتیسم، به‌عنوان یک اختلال در حیطهٔ رشدی-عصبی مطرح است؛ اما اغلب با سایر اختلالات جسمی و حرکتی همراه است (۲). اختلالات حرکتی، راه‌رفتن غیرهماهنگ، اختلالات قامت^۳، هماهنگی، تعادل و نقص مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم دیده می‌شود (۳). درمقایسه با جمعیت عمومی، افراد با اختلال طیف اتیسم، با افزایش نرخ اختلالات روان‌پزشکی، بیماری‌های سیستم ایمنی، فشارخون بالا، دیابت و چاقی روبه‌رو هستند (۴). فعالیت بدنی^۴، بخش مهمی از سبک زندگی سالم برای همهٔ افراد جامعه است و از بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن وابسته به سلامت همانند بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، بیماری‌های سوخت‌وساز و سرطان جلوگیری می‌کند (۵). مشخص شد، اکثر افراد در ایالات متحدهٔ آمریکا، حداقل میزان توصیه‌شدهٔ فعالیت بدنی روزانه را برآورده نمی‌کنند که این نرخ در افراد دارای معلولیت و به‌ویژه افراد با اختلال طیف اتیسم به‌مراتب بیشتر از افراد بدون معلولیت است (۶). در مطالعه‌ای سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم در ایران درمقایسه با هم‌تایان غیراتیسم، پایین به‌دست آمد (۷)؛ به‌طورکلی با مروری بر مطالعات روشن شد، سبک زندگی کم‌تحرک و کاهش سطح فعالیت‌های بدنی درمقایسه با هم‌تایان غیراتیسم در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم گزارش شده است (۸).

عوامل بسیاری در کمبود مشارکت افراد با اختلال طیف اتیسم در فعالیت‌های بدنی دخیل است؛ مانند داروهای روان‌پزشکی، اختلالات خواب، اضطراب اجتماعی، موانع زیست‌محیطی و سایر نشانه‌های جسمانی مرتبط با اختلال اتیسم (۹). علاوه‌براین، تأخیر در دستیابی و نقص در مهارت‌های حرکتی و آمادگی جسمانی ضعیف (۷)، نبود شناخت و درک قوانین و غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتارها (۱۰)، ارتباطات اجتماعی محدود، انگیزهٔ کم، نقص در سازمان‌دهی حرکات (۳)، مسائل اقتصادی و کمبودها، از عوامل محدودکنندهٔ مشارکت در فعالیت بدنی است (۱۱). این عوامل مشارکت کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم را در ورزش‌ها و فعالیت‌های بدنی کم می‌کند و متعاقباً آن‌ها را در معرض خطر مشکلات سلامتی مرتبط با کم‌تحرکی قرار خواهد داد (۳). کاهش مشارکت این افراد در فعالیت‌های بدنی در سنین ابتدایی رشد بسیار مهم است (۱۱). فعالیت بدنی برای کاهش نشانه‌های اختلال اتیسم و ارتقای سطح سلامت آن‌ها ضرورت دارد. فعالیت بدنی دارای فوایدی مانند کاهش رفتارهای کلیشه‌ای، افزایش پاسخ‌های رفتاری مناسب، بهبود تعاملات اجتماعی (۱)، ارتقای آمادگی جسمانی و مهارت‌های حرکتی (۶)، بهبود عملکردهای فیزیولوژیک و افزایش تمرکز و توجه و خودتنظیمی (۳) در افراد با اختلال طیف اتیسم است. باوجود مزایای بالقوهٔ فعالیت بدنی، کودکان

و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم نتوانستند به استانداردهای توصیه‌شدهٔ فعالیت بدنی روزانه پاسخ دهند (۳، ۱۱).

کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم و والدین آن‌ها چالش‌های جسمی و روحی زیادی را در گذر از کودکی به بزرگسالی تجربه می‌کنند که کاهش فعالیت‌های بدنی یکی از چالش‌های پیش‌رو در سلامت جسمانی و روانی و عاطفی این افراد در دوران کودکی و آینده است (۱۱). در مطالعه‌ای با بررسی اثرات گذار از دورهٔ نوجوانی به بزرگسالی از منظر سلامت در نوجوانان بدون معلولیت عنوان شد که با افزایش سن و ورود به بزرگسالی، ۲۴ درصد میزان فعالیت بدنی کاهش یافته و اضطراب و تنهایی افزایش می‌یابد. همچنین در افرادی با شاخص فعالیت بدنی کمتر، سطح سلامت روانی، پایین‌تر گزارش شده است (۱۲). با توجه به چالش‌های پیش‌رو در گذار به بزرگسالی در افراد با اختلال طیف اتیسم و نیز کاهش چشمگیر خدمات دریافتی برای ارتقای سلامتی و ادغام اجتماعی در این افراد پس از سنین دبیرستان، توجه به اهمیت فعالیت بدنی و توسعهٔ مشارکت در آن در سنین کمتر، برای این کودکان حیاتی است (۱۳). با افزایش سن در کودکان با اختلال طیف اتیسم به‌سبب رویارویی با محدودیت‌ها و اختلالات تکاملی، آن‌ها درمقایسه با هم‌تایان غیراتیسم، بیشتر در معرض کم‌تحرکی و چاقی و خطرات ناشی از آن قرار دارند (۳).

ازآنجاکه عادت‌ها و رفتارهای مربوط به فعالیت بدنی در دوران کودکی شکل می‌گیرند و تا بزرگسالی ادامه می‌یابند و با توجه به اینکه نوع و شدت اختلالات و رفتارهای وابسته به آن در افراد با اختلال طیف اتیسم بسیار متفاوت و متغیر است (۱۱)، به‌نظر می‌رسد سطح فعالیت بدنی نیز در آن‌ها متفاوت باشد؛ ازاین‌رو ارزیابی فعالیت بدنی این کودکان و چگونگی تغییرات آن همراه با افزایش سن، در پیش‌بینی وضعیت فعالیت بدنی آن‌ها در آینده و پیشگیری از کم‌تحرکی در بزرگسالی اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین با توجه به ضرورت پرداختن به فعالیت‌های بدنی و اینکه کاهش مشارکت این افراد در فعالیت‌های بدنی، آن‌ها را در معرض خطر مشکلات سلامتی مرتبط با کم‌تحرکی و سلامت جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی قرار می‌دهد (۲)، پژوهش حاضر با هدف مقایسهٔ سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم ایران برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی، شدت اختلال و نوع اختلالات همبود انجام شد.

۲ روش بررسی

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود. جامعهٔ آماری را تمامی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم ایران تشکیل دادند. نمونهٔ آماری پژوهش، ۳۷۰ کودک و نوجوان با اختلال طیف اتیسم از هر دو جنسیت و سنین ۸ تا ۲۰ سال بودند. شیوهٔ نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. در ابتدا کل کشور به نه منطقهٔ جغرافیایی تقسیم شد که از نظر محیطی، فرهنگی، اقتصادی و ژنتیکی یکدیگر نزدیک بودند. این مناطق عبارت بود از: منطقهٔ ۱: استان‌های گلستان، مازندران، گیلان؛ منطقهٔ ۲: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی؛ منطقهٔ ۳: استان‌های سیستان و بلوچستان،

۳. Posture
۴. Physical activity

۱. Autism Spectrum Disorders
۲. Neuro-Developmental Disorder

بعد از زمان کلاس درس، عصرها و آخر هفته‌ها است. سؤال نهم درباره میانگین فعالیت بدنی در کل روزهای هفته گذشته است. سؤال آخر برای شناسایی افرادی است که در طول هفته گذشته به دلیل بیماری یا شرایط خاص نتوانستند در فعالیت‌های بدنی مشارکت کنند (۱۷). روان‌سنجی این پرسش‌نامه‌ها در ایران توسط بیلاقی اشرفی و همکاران انجام شد و به تأیید رسید. برای پرسش‌نامه فعالیت بدنی نوجوانان، شاخص روایی محتوا ۰/۹۰ و ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۷ به دست آمد (۱۸). همچنین ضامنی و همکاران برای پرسش‌نامه فعالیت بدنی کودکان، ضریب آلفای کرونباخ را برابر با ۰/۸۹ و شاخص روایی محتوا را برابر با ۰/۹۱ گزارش کردند (۱۹). بنابراین مطالعات نشان داد، این دو پرسش‌نامه ابزاری روا و پایا برای سنجش فعالیت بدنی است. در این پژوهش شدت اختلال و اختلالات همبود با استناد به پرونده پزشکی افراد به دست آمد؛ بدین صورت که از خانواده‌ها درخواست شد تا برحسب تشخیص‌های بالینی صورت گرفته روی فرزند خود، شدت و نوع اختلالات همبود را در بخش مشخصات دموگرافیک پرسش‌نامه ارسالی مشخص کنند.

روش‌های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (آنوا) و آزمون تعقیبی شفه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ به کار رفت. به منظور مقایسه سطح فعالیت بدنی دختران و پسران با اختلال طیف اتیسم از آزمون تی مستقل و برای پاسخ به مقایسه سطح فعالیت بدنی برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی، شدت اختلال و نوع اختلالات همبود از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (آنوا) (به دلیل اینکه تعداد گروه‌ها در سؤالات بیشتر از دو است) استفاده شد. سطح معناداری آزمون‌های آماری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

۳ یافته‌ها

شرکت‌کنندگان این مطالعه را ۳۷۰ کودک و نوجوان با اختلال طیف اتیسم با میانگین سنی $12/180 \pm 1/65$ سال و قد $155/50 \pm 5/14$ سانتی‌متر و وزن $53/30 \pm 2/28$ کیلوگرم تشکیل دادند. خصوصیات ویژگی‌های فردی شرکت‌کنندگان پژوهش به ترتیب برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی، شدت اختلال و نوع اختلالات همبود در جدول ۱ آورده شده است. اطلاعات توصیفی حاصل از توزیع فراوانی سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم در جدول ۲ آورده شده است.

برای بررسی پیش فرض برابری واریانس‌های سطح فعالیت بدنی در دختران و پسران با اختلال طیف اتیسم از آزمون لون استفاده شد که براساس نتایج، برابری واریانس میانگین‌های مطالعه شده رد نشد ($p > 0/05$). نتایج آزمون شاپیرو-ویلک و آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای هر یک از متغیرها در گروه‌های بررسی شده، نشان‌دهنده توزیع نرمال داده‌ها در سطح معناداری ۰/۰۵ بود ($p > 0/05$). آزمون لون برای بررسی همگنی کوواریانس و واریانس در هر متغیر به کار رفت و نتایج بیانگر پذیرش مفروضه همگنی کوواریانس‌ها و واریانس‌ها و دیگر مفروضه‌های این آزمون بود

کرمان، یزد؛ منطقه ۴: استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان؛ منطقه ۵: استان‌های فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری؛ منطقه ۶: استان‌های قزوین، البرز، همدان، سمنان، مرکزی؛ منطقه ۷: استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام؛ منطقه ۸: استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان؛ منطقه ۹: استان تهران. سپس، یک استان در هر منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد و در هر استان منتخب، مراکز به طور تصادفی گزینش شدند. براساس فرمول کوکران و با سطح اطمینان ۹۵ درصد، با احتساب جامعه آماری بیشتر از صدهزار نفر، تعداد کل نمونه، ۳۸۴ نفر به دست آمد (۱۴)؛ بنابراین در مرحله توزیع پرسش‌نامه با احتساب ریزش نمونه‌ها یا ناکامل بودن پرسش‌نامه‌ها، تعداد نمونه‌ها در مرحله توزیع پرسش‌نامه بیشتر برآورد شد؛ به طوری که چهارصد پرسش‌نامه فعالیت بدنی برای کودکان^۱ (۱۵) و فعالیت بدنی برای نوجوانان^۲ (۱۶)، به صورت الکترونیکی برای خانواده‌های دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم ارسال شد و از پدر یا مادر خواسته شد برحسب وضعیت فرزند خود به سؤالات پاسخ دهند. به دلیل ناکامل بودن برخی از پرسش‌نامه‌ها در نهایت تعداد ۳۷۰ پرسش‌نامه دریافت شد و وارد مراحل تجزیه و تحلیل شد. ملاحظات اخلاقی پژوهش مطابق با دستورعمل کمیته اخلاق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به تأیید رسید.

در این پژوهش، پرسش‌نامه فعالیت بدنی برای کودکان که توسط کراکر و همکاران در سال ۱۹۹۷ (۱۵) و پرسش‌نامه فعالیت بدنی برای نوجوانان که توسط کوالسکی و همکاران در سال ۱۹۹۷ (۱۶) تهیه و اعتبارسنجی شد، به کار رفت. این دو پرسش‌نامه، اندازه‌گیری کلی فعالیت بدنی را به ترتیب برای سنین ۱۴ تا ۸ سال و ۱۴ تا ۲۰ سال ارائه می‌دهند و پرسش‌نامه‌های هفت‌روزه خودگزارشی هستند که سطح فعالیت بدنی فرد را در بازه زمانی یک هفته گذشته می‌سنجند. اقدامات خودگزارشی اغلب به عنوان ابزاری معتبر برای ارزیابی سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان به کار می‌روند؛ زیرا به طور معمول کم‌هزینه هستند و می‌توانند در جمعیت‌های بزرگ اجرا شوند (۱۷). این دو پرسش‌نامه از یک طرح نمره‌گذاری مشترک استفاده می‌کنند. پرسش‌نامه مخصوص کودکان ده سؤال و پرسش‌نامه ویژه نوجوانان نه سؤال دارد. شیوه نمره‌گذاری بدین صورت است که برای هر فعالیت، امتیازاتی بین ۱ تا ۵ تعلق می‌گیرد (به استثنای سؤال ۱۰). کمترین میزان فعالیت بدنی نمره ۱ و بیشترین میزان فعالیت بدنی نمره ۵ دارد و میانگین کل نمرات، جمع‌بندی نهایی سطح فعالیت بدنی است. در این پرسش‌نامه نمرات فعالیت بدنی بین ۱ تا ۲/۳۳۳ به عنوان سطح پایین فعالیت بدنی، نمرات بین ۲/۳۳۴ تا ۳/۶۶۶ به عنوان سطح فعالیت بدنی متوسط و نمرات بیشتر از ۳/۶۶۷ تا ۵ به عنوان سطح بالای فعالیت بدنی طبقه‌بندی شده است (۱۷). در بسیاری از مطالعات شیوه گزارش دهی براساس درصد فراوانی پیشنهاد می‌شود تا اطلاعات قابل درک‌تری از سطوح فعالیت بدنی را فراهم آورد (۱۷). سؤال اول پرسش‌نامه شامل فهرستی از فعالیت‌های مختلف می‌شود و مشخص می‌کند فرد در طی هفته گذشته در کدام فعالیت و چند بار مشارکت داشته است. سؤالات دوم تا هشتم درخصوص مقدار فعالیت بدنی در کلاس‌های تربیت بدنی، زمان ناهار،

2. Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A)

1. Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C)

جدول ۱. خصوصیات و ویژگی‌های فردی شرکت‌کنندگان ($n=370$)

درصد	فراوانی	متغیر	
۶۳/۰	۲۳۳	پسر	متغیر جنسیت
۳۷/۰	۱۳۷	دختر	
۱۰۰/۰	۳۷۰	کل	
۶۲/۲	۲۳۰	ابتدایی	متغیر مقطع تحصیلی
۲۳/۸	۸۸	متوسطه اول	
۱۳/۵	۵۰	متوسطه دوم	
۰/۵	۲	پاسخ داده نشده	
۱۰۰/۰	۳۷۰	کل	
۲۳/۵	۸۷	اتیسم خفیف	متغیر شدت اختلال
۳۷/۳	۱۳۸	اتیسم متوسط	
۲۳/۸	۸۸	اتیسم شدید	
۵/۹	۲۲	آسپرگر	
۱/۴	۵	سندرم رت	
۰/۵	۲	سایر موارد	
۷/۶	۲۸	پاسخ داده نشده	
۱۰۰/۰	۳۷۰	کل	
۱۵/۱	۵۶	اختلال اضطرابی	متغیر اختلال همبود
۱۷/۳	۶۴	اختلال یادگیری	
۱۶/۵	۶۱	کم‌توانی ذهنی	
۱۹/۵	۷۲	بیش‌فعالی و نقص توجه	
۲۳/۲	۸۶	اختلال هماهنگی رشدی	
۳/۵	۱۳	بدون اختلال همبود	
۴/۱	۱۵	تمام موارد	
۰/۸	۳	سایر موارد	
۱۰۰	۳۷۰	کل	

جدول ۲. اطلاعات توصیفی توزیع فراوانی سطح فعالیت بدنی شرکت‌کنندگان طی هفت روز گذشته

درصد فراوانی	تعداد	
در طول کلاس‌های تربیت بدنی و ورزش		
۵۸/۴	۲۱۶	اصلاً در کلاس‌های تربیت بدنی و ورزش شرکت نکردند.
۲۹/۷	۱۱۰	به ندرت در کلاس‌های تربیت بدنی و ورزش شرکت کردند.
۱۱/۴	۴۲	گاهی اوقات در کلاس‌های تربیت بدنی و ورزش شرکت کردند.
۰/۵	۲	اغلب در کلاس‌های تربیت بدنی و ورزش مشارکت داشتند.
در آخر هفته‌ها		
۵۸/۶	۲۱۷	وضعیت نشسته
۱۴/۶	۵۴	به مقدار کمی دویدن یا بازی کردن
۱/۱	۴	به مقدار زیادی دویدن یا بازی کردن
بهترین توصیف از فعالیت بدنی فرد		
۷۳/۸	۲۷۳	تمام یا بیشتر اوقات فراغت من صرف انجام کارهایی با تلاش فیزیکی اندک شد.
۱۷/۸	۶۶	گاهی اوقات (هفته گذشته ۱ تا ۲ بار) در اوقات فراغت فعالیت‌های بدنی انجام دادم.
۶/۵	۲۴	اغلب (هفته گذشته ۳ تا ۴ بار) در اوقات فراغت، فعالیت‌های بدنی انجام دادم.
۱/۱	۴	اغلب (هفته گذشته ۵ تا ۶ بار) در اوقات فراغت، فعالیت‌های بدنی انجام دادم.
صفر	صفر	هر روز هفته را فعالیت بدنی انجام دادم.

جدول ۳. میانگین و انحراف معیار سطح فعالیت بدنی در دختران و پسران

متغیر	میانگین	انحراف معیار
سطح فعالیت بدنی دختران	۲/۱۸	۰/۹۶
سطح فعالیت بدنی پسران	۲/۳۰	۱/۰۸

باتوجه به جدول ۳، میانگین سطح فعالیت بدنی در پسران برابر با آمد. ۲/۳۰ و میانگین سطح فعالیت بدنی در دختران برابر با ۲/۱۸ به دست

جدول ۴. نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه سطح فعالیت بدنی دختران و پسران با اختلال طیف اتیسم

شاخص‌های آماری		مقدار تی	درجه آزادی	مقدار احتمال	تفاوت میانگین‌ها	فاصله اطمینان ۹۵ درصد تفاوت‌ها
متغیر	سطح فعالیت بدنی	۱/۴۵۴	۳۶۸	۰/۱۴۷	۰/۴۶۵	سطح پایین سطح بالا
						۰/۱۰۹

با بررسی جدول ۴، تفاوت معناداری بین سطح فعالیت بدنی پسران و دختران با اختلال طیف اتیسم وجود نداشت ($p=0/147$). در هر یک از مقاطع، در جدول ۵ ارائه شد. پس از آن، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه به کار رفت که نتایج آن در جدول ۶ مشاهده می‌شود. به منظور مقایسه سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال

جدول ۵. میانگین و انحراف معیار سطح فعالیت بدنی باتوجه به مقطع تحصیلی

متغیر	میانگین	انحراف معیار
ابتدایی	۲/۱۸	۰/۸۶
متوسط اول	۲/۱۷	۱/۰۱
متوسط دوم	۲/۰۲	۰/۹۶

جدول ۵ نشان می‌دهد، میانگین سطح فعالیت بدنی در مقطع ابتدایی با ۲/۱۸ دارای بیشترین مقدار بود و پس از آن مقطع متوسط اول با ۲/۰۲ در رده دوم و مقطع متوسط دوم با مقدار میانگین

جدول ۶. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه برای مقایسه سطح فعالیت بدنی باتوجه به مقطع تحصیلی

متغیر	مجموع مربعات	درجات آزادی	میانگین مربعات	F	مقدار احتمال
بین‌گروهی	۱/۹۴۱	۳	۰/۶۴۷		
درون‌گروهی	۳۰/۵۹۱	۳۶۴	۰/۰۸۴	۷/۶۰۷	<0/001
کل	۳۲/۵۳۱	۲۶۷	-		

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه در جدول ۶ نشان داد، بین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان طیف اتیسم باتوجه به مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت ($p<0/001$). در ادامه به منظور یافتن

جدول ۷. نتایج آزمون شفه به منظور بررسی جایگاه تفاوت‌ها باتوجه به مقطع تحصیلی

گروه (I)	گروه (J)	اختلاف میانگین‌ها	خطای استاندارد	مقدار احتمال
ابتدایی	متوسط اول	۰/۰۰۸	۰/۳۶۴	۰/۹۹۷
	متوسط دوم	۰/۱۵۳	۰/۰۴۵	۰/۰۱۰
متوسط اول	متوسط دوم	۰/۱۴۴	۰/۰۵۱	۰/۰۴۹

باتوجه به نتایج جدول ۷ یافته‌های آزمون تعقیبی شفه نشان داد، بین کودکان مقطع تحصیلی ابتدایی با نوجوانان مقطع تحصیلی متوسط دوم ($p=0/010$) و همچنین بین کودکان مقطع متوسط اول با کودکان مقطع تحصیلی متوسط دوم ($p=0/049$) در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری وجود داشت. برای مقایسه سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال

طیف اتیسم باتوجه به شدت اختلال، ابتدا میانگین و انحراف معیار و جداول ۸ و ۹ به ترتیب آورده شده است. پس از آن آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج در جدول ۸. میانگین و انحراف معیار سطح فعالیت بدنی باتوجه به شدت اختلال

متغیر	میانگین	انحراف معیار
اتیسم خفیف	۲/۱۶	۱/۱۴
اتیسم متوسط	۲/۱۳	۰/۸۳
اتیسم شدید	۲/۰۸	۰/۹۴
آسپرگر	۲/۲۵	۱/۰۶
سندرم رت	۱/۸۱	۰/۹۸

جدول ۸ نشان می‌دهد که سطح فعالیت بدنی باتوجه به شدت اختلال، رت کمترین مقدار را با میانگین ۱/۸۱ داشت. در میان نوع اختلال آسپرگر بیشترین مقدار را با میانگین ۲/۲۵ و سندرم

جدول ۹. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه سطح فعالیت بدنی باتوجه به شدت اختلال

متغیر	مجموع مربعات	درجات آزادی	میانگین مربعات	F	مقدار احتمال
بین‌گروهی	۲/۰۵۸	۳	۰/۴۱۲		
درون‌گروهی	۲۹/۶۱۰	۳۶۴	۰/۰۸۸	۴/۶۷۰	<۰/۰۰۱
کل	۳۱/۶۶۸	۲۶۷	-		

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه در جدول ۹ مشخص کرد، بین سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم باتوجه به شدت اختلال، تفاوت معناداری وجود داشت ($p < ۰/۰۰۱$). در ادامه

جدول ۱۰. یافته‌های آزمون شفه به‌منظور بررسی جایگاه تفاوت‌ها باتوجه به شدت اختلال

گروه (I)	گروه (J)	اختلاف میانگین‌ها	خطای استاندارد	مقدار احتمال
	اتیسم متوسط	۰/۰۲۶	۰/۰۴۰	۰/۹۹۵
	اتیسم شدید	۰/۰۷۶	۰/۰۴۴	۰/۰۳۶
اتیسم خفیف	آسپرگر	۰/۰۹۳	۰/۰۷۰	۰/۰۱۲
	سندرم رت	۰/۳۴۵	۰/۱۳۶	۰/۰۰۲
	اتیسم شدید	۰/۰۴۷	۰/۰۴۰	۰/۰۳۱
	آسپرگر	۰/۱۶۹	۰/۰۶۸	۰/۰۰۶
	سندرم رت	۰/۳۷۱	۰/۱۳۵	۰/۱۸۶
	آسپرگر	۰/۱۶۶	۰/۰۷۰	۰/۰۴۶
اتیسم شدید	سندرم رت	۰/۲۶۸	۰/۱۳۶	۰/۰۹۸
آسپرگر	سندرم رت	۰/۴۴۱	۰/۱۴۷	۰/۳۲۲

یافته‌های آزمون تعقیبی شفه در جدول ۱۰ نشان داد، بین کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم خفیف با کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم شدید ($p = ۰/۰۳۶$)، آسپرگر ($p = ۰/۰۱۲$) و سندرم رت ($p = ۰/۰۰۲$) در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری وجود داشت. میان کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم متوسط با کودکان و نوجوانان با اتیسم شدید ($p = ۰/۰۳۱$) و آسپرگر ($p = ۰/۰۰۶$) در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری مشاهده شد؛ همچنین بین کودکان و نوجوانان با اتیسم شدید و آسپرگر در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری وجود داشت ($p = ۰/۰۴۶$). به‌منظور مقایسه سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم باتوجه به نوع اختلالات ثانویه (همبود)، ابتدا میانگین و انحراف معیار و پس از آن آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج در جداول ۱۱ و ۱۲ به ترتیب آورده شده است.

مطابق با جدول ۱۱، میانگین سطح فعالیت بدنی باتوجه به اختلالات ثانویه (همبود) در میان کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم بدون اختلال همبود، با میانگین ۲/۵۲ بیشترین مقدار بود و آنان که تمام موارد اختلال همبود را داشتند با میانگین ۱/۴۳، دارای کمترین میزان فعالیت بدنی بودند.

مطابق با جدول ۱۱، میانگین سطح فعالیت بدنی باتوجه به اختلالات ثانویه (همبود) در میان کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم بدون اختلال همبود، با میانگین ۲/۵۲ بیشترین مقدار بود و آنان که تمام موارد اختلال همبود را داشتند با میانگین ۱/۴۳، دارای کمترین میزان فعالیت بدنی بودند.

جدول ۱۱. میانگین و انحراف معیار سطح فعالیت بدنی با توجه به اختلالات ثانویه (همبود)

متغیر	میانگین	انحراف معیار
اختلال اضطرابی	۲/۱۳	۱/۰۴
اختلال یادگیری	۲/۰۸	۰/۸۱
کم‌توانی ذهنی	۱/۹۵	۱/۰۷
بیش‌فعالی و نقص توجه	۲/۲۵	۱/۰۴
اختلال هماهنگی رشدی	۲/۰۴	۰/۷۶
بدون اختلال همبود	۲/۵۲	۱/۰۲
تمام موارد	۱/۴۳	۰/۹۸
سایر موارد	۲/۲۳	۱/۱۲

جدول ۱۲. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه برای مقایسه سطح فعالیت بدنی با توجه به نوع اختلالات ثانویه (همبود)

متغیر	مجموع مربعات	درجات آزادی	میانگین مربعات	F	مقدار احتمال
بین‌گروهی	۱/۳۱۱	۳	۰/۱۸۷		
درون‌گروهی	۳۱/۳۵۵	۳۶۴	۰/۰۸۷	۲/۱۶۳	۰/۰۵۷
کل	۳۲/۶۶۶	۲۶۷	-		

تفاوت معناداری وجود داشت. علاوه‌براین بین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با توجه به اختلالات همبود تفاوت معناداری مشاهده نشد.

در این بخش به بررسی سطح فعالیت بدنی و تفاوت‌های جنسیتی در سطح فعالیت‌های بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم پرداخته می‌شود و با مروری بر مطالعات پیشین و مقایسه آن با نتایج مطالعه حاضر، نقش جنسیت در سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم ارزیابی می‌گردد.

سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان و بزرگسالان با اختلال طیف اتیسم پایین است؛ به‌طوری‌که نوجوانان با اختلال طیف اتیسم در مقایسه با هم‌تایان خود، ۶۰ درصد کمتر احتمال دارد در فعالیت‌های بدنی شرکت کنند و ۷۴ درصد کمتر احتمال شرکت در یک ورزش سازمان‌یافته را دارند (۲۰). در مطالعه معماری و همکاران، میزان فعالیت بدنی ۵۲ پسر و ۳۱ دختر با اختلال طیف اتیسم در سنین ۶ تا ۱۵ سال بررسی شد. یافته‌ها نشان داد، ۸۵/۵ درصد کودکان با اختلال طیف اتیسم «هرگز/به‌ندرت» در فعالیت بدنی شرکت کردند و ۵/۸ درصد «گاهی» و فقط ۶ درصد «اغلب» فعالیت بدنی داشتند (۷). در پژوهشی استانیس و همکاران به بررسی فعالیت بدنی در میان شصت دختر و پسر با اختلال طیف اتیسم پرداختند. نتایج مشخص کرد، میانگین زمان صرف‌شده در فعالیت‌های بدنی متوسط تا شدید تفاوت معناداری با میانگین زمان صرف‌شده در فعالیت‌های نشسته بی‌تحرك دارد و این کودکان در مقایسه با هم‌تایان سالم خود بیشتر غیرفعال هستند؛ به‌گونه‌ای‌که نوجوانان کمتر از شانزده سال با اختلال طیف اتیسم، در فعالیت‌های بدنی کمتری در مقایسه با هم‌تایان غیراتیسم شرکت دارند (۲۹ دقیقه در روز در مقابل ۵۰ دقیقه در روز) و کمتر از دستورعمل‌های توصیه‌شده فعالیت بدنی برای آمریکایی‌ها (۱۴ درصد در مقابل ۲۹ درصد) پیروی می‌کنند (۲۱). در پژوهشی بین

باتوجه به جدول ۱۲ نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد، بین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با توجه به نوع اختلالات ثانویه (همبود) تفاوت معناداری وجود نداشت ($p=0/057$).

۴ بحث

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سطح فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم ایران برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی، شدت اختلال و نوع اختلالات همبود انجام شد. براساس نتایج مطالعه حاضر، در ۷۳/۸ درصد کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم، تمام یا بیشتر اوقات فراغت، صرف انجام کارهایی با تلاش فیزیکی اندک شد و ۵۸/۴ درصد از آن‌ها طی یک هفته گذشته در هیچ کلاس تربیت‌بدنی و ورزش شرکت نکردند. همچنین براساس سطح فعالیت بدنی برحسب جنسیت، بین سطح فعالیت بدنی پسران و دختران تفاوت آماری معناداری وجود نداشت؛ علاوه‌براین، بین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با توجه به شدت اختلال و مقطع تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد. سطح فعالیت بدنی با افزایش سن و ورود به مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم با کاهش همراه بود. بین کودکان مقطع تحصیلی ابتدایی با نوجوانان مقطع تحصیلی متوسطه دوم، همچنین بین کودکان مقطع متوسطه اول با کودکان مقطع تحصیلی متوسطه دوم در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری مشاهده شد. برحسب شدت اختلال، بین کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم خفیف با کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم شدید، آسپرگر و سندرم رت در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری وجود داشت. میان کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم متوسط با کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم شدید و آسپرگر در میزان فعالیت بدنی تفاوت معناداری دیده شد؛ همچنین بین کودکان و نوجوانان با اختلال اتیسم شدید و آسپرگر در میزان فعالیت بدنی

جوانان ۱۸ تا ۲۷ ساله با اختلال طیف اتیسم، تنها ۱۰ درصد آن‌ها «اغلب»، ۵۷ درصد «گاهی اوقات» و ۳۳ درصد «هرگز» را گزارش کردند؛ به‌طور کلی نتایج نشان داد، سطح پایینی از فعالیت‌های بدنی در افراد با اختلال طیف اتیسم مشاهده می‌شود که این عامل توأم با آمادگی جسمانی کم، افزایش خطرات مرتبط با سلامتی و کم‌ تحرکی مانند اضافه‌وزن را در آن‌ها در مقایسه با سایر هم‌تایان بدون اختلال طیف اتیسم به‌همراه دارد (۲۲).

در توضیح نقش جنسیت در مشارکت در فعالیت‌های بدنی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم، نتایج پژوهش حاضر تفاوت معناداری را میان سطح فعالیت بدنی دختران و پسران با اختلال طیف اتیسم نشان نداد. مک‌کوی و همکاران، تفاوتی را بین سطح فعالیت بدنی دختران و پسران با اختلال طیف اتیسم گزارش نکردند (۲۳) که با یافته‌های حاضر همسوست. معماری و همکاران تفاوت جنسیتی را در سطح فعالیت بدنی عنوان کردند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت بدنی در پسران با اختلال طیف اتیسم بیشتر از دختران بود (۲۴) که با یافته‌های حاضر ناهم‌سوست. این امر می‌تواند به دلیل تفاوت در عملکردهای شناختی و اجتماعی در دختران و پسران باشد که به نابرابری جنسیتی در فرصت‌های مشارکت منجر می‌شود؛ البته امکان دارد تحت تأثیر مسائل فرهنگی جامعه نیز قرار گیرد (۲۵). همچنین ممکن است، دوره زمانی متفاوت انجام پژوهش و شرایط همه‌گیری کووید ۱۹ و کاهش فعالیت بدنی ناشی از کمبود فضای ورزشی و همچنین غیرحضور شدن مدارس در ایران، بر فعالیت بدنی دختران و پسران به‌طور یکسان تأثیر گذاشته باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد، تفاوت‌های جنسیتی در اختلالات کلامی، ارتباطی و اجتماعی، حرکات کلیشه‌ای و مهارت‌های انطباقی در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم وجود دارد و این عوامل بر تمام حوزه‌های عملکردهای رفتاری فارغ از سن اثر منفی می‌گذارد (۲۶)؛ بنابراین با توجه به اینکه فعالیت بدنی نوعی از رفتار عملکردی محسوب می‌شود، شاید علت نتایج متناقض در خصوص نقش عامل جنسیت در سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم ناشی از نقص در مهارت‌های انطباقی، حرکات کلیشه‌ای و رفتارهای ناسازگارانه باشد. شاید آستانه ژنتیکی بالاتر برای اختلال طیف اتیسم در زنان و تفاوت‌های هورمونی مربوط به اختلال، عواملی مانند خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و انگیزه، تفاوت فعالیت بدنی در میان پسران و دختران را توضیح دهد (۲۵). با توجه به مطالعات مطرح شده به نظر می‌رسد، به دلیل وجود داشتن ساختارهای تبعیض جنسیتی و مسائل فرهنگی و نیز شرایط همه‌گیری کووید ۱۹ که بر دختران و پسران با اختلال طیف اتیسم کشور تأثیر یکسان گذاشته است، در شرکت‌کنندگان مطالعه حاضر تفاوت معناداری بین دختران و پسران در سطح فعالیت بدنی یافت نشد.

نتایج پژوهش حاضر مشخص کرد، بین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با توجه به شدت اختلال تفاوت معناداری وجود داشت؛ اما با توجه به نوع اختلالات همبود تفاوت معناداری مشاهده نشد. در توضیح نقش شدت اختلال در سطح فعالیت بدنی، مطالعه مک‌کوی و همکاران، فعالیت بدنی را در نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با نوجوانان غیراتیسم مقایسه کرد. نتایج نشان

داد، شدت اختلال اتیسم بیشتر با افزایش اضافه‌وزن و چاقی و کاهش مشارکت در فعالیت‌های بدنی و ورزش و شرکت در باشگاه همراه است. افراد با درجه خفیف اختلال طیف اتیسم، ۴۳ درصد بیشتر در معرض چاقی هستند. افراد با درجه متوسط اختلال طیف اتیسم، ۲/۰۲ برابر بیشتر در معرض چاقی قرار دارند و افراد با درجه اتیسم شدید، ۲/۲۸ برابر بیشتر در معرض چاقی هستند. همچنین افراد با اختلال اتیسم خفیف، ۵۶ درصد کمتر به فعالیت بدنی می‌پردازند و افراد با اتیسم شدید ۷۰ درصد کمتر درگیر فعالیت بدنی می‌شوند (۲۶). در مطالعه‌ای، فرکانس فعالیت بدنی در چهار سطح به‌صورت صفر روز، ۱ تا ۳ روز، ۴ تا ۶ روز و هر روز و شدت اختلال اتیسم به‌صورت خفیف، متوسط و شدید طبقه‌بندی شد. هیچ ارتباطی بین شدت اختلال اتیسم و میزان مشارکت در فعالیت بدنی یافت نشد (۲۷). همچنین معماری و همکاران دریافتند، هیچ ارتباطی بین شدت اختلال طیف اتیسم با سطح فعالیت بدنی وجود ندارد (۲۴). نتایج پژوهش‌های مذکور با یافته‌های پژوهش حاضر ناهم‌سوست؛ اما همان‌طور که ذکر شد، در مطالعه مک‌کوی و همکاران سطح فعالیت‌های بدنی با شدت اختلال اتیسم ارتباط مستقیم داشت؛ به‌طوری‌که افراد با شدت اتیسم بیشتر، دارای سطح فعالیت بدنی پایین‌تری بودند (۲۶). این یافته با نتایج پژوهش حاضر همسوست. مک‌کوی و همکاران گزارش کردند، با افزایش شدت اختلال اتیسم و نیاز به حمایت بیشتر، این احتمال وجود دارد که دسترسی به فرصت‌های مشارکت در فعالیت‌های بدنی کاهش یابد (۲۶) و شاید این امر دللی بر یافته‌های مذکور باشد. در پژوهشی مشخص شد، نوجوانان با اختلال اتیسم خفیف در مقایسه با هم‌تایان غیراتیسم خود، ۵۹ درصد کمتر احتمال دارد درگیر فعالیت‌های بدنی روزمره (شخصت دقیقه و بیشتر) شوند؛ همچنین افراد با اختلال اتیسم متوسط ۵۳ درصد کمتر احتمال دارد درگیر فعالیت‌های بدنی روزمره شوند و افراد با اختلال اتیسم شدید ۵۶ درصد کمتر احتمال دارد در این فعالیت‌ها مشارکت کنند؛ به‌علاوه افراد با اختلال اتیسم خفیف، ۷۶ درصد کمتر احتمال مشارکت در فعالیت‌های ورزشی را در دوازده ماه اخیر در مقایسه با هم‌تایان غیراتیسم خود دارند. در افراد با اختلال اتیسم متوسط این احتمال ۸۴ درصد و در افراد با اختلال اتیسم شدید ۹۴ درصد است (۲۷).

در مطالعه‌ای گزارش شد، برای آن دسته از افراد با اختلال طیف اتیسم که دارای اختلالات همبود هستند، سطح فعالیت بدنی پایین‌تر از سایر افراد است (۲۸). یافته‌های این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر ناهم‌سوست. شاید علت ناهم‌سویی تفاوت در ابزارهای اندازه‌گیری و سن شرکت‌کنندگان و بازه زمانی ثبت اطلاعات باشد. به دلیل اینکه مطالعه حاضر در شرایط همه‌گیری کووید ۱۹ انجام شد، می‌تواند بر سطح فعالیت‌های بدنی اثرات سوء داشته باشد. در پژوهش حاضر تفاوت معناداری در سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم برحسب اختلالات همبود وجود نداشت و بین افراد با اختلال طیف اتیسم بدون اختلالات همبود و افراد دارای اختلالات همبود مانند کم‌توانی ذهنی، اختلال اضطرابی، اختلال یادگیری، بیش‌فعالی با نقص توجه و اختلال هماهنگی رشدی، تفاوت معناداری

مصرف کالری یا اطلاعات مربوط به تواتر، زمان و شدت دقیق فعالیت ارائه نمی‌دهد و تمایزی بین شدت فعالیت‌های بدنی قائل نمی‌شود (۱۹). پیشنهاد می‌شود، به منظور ارتقای مشارکت افراد با اختلال طیف اتیسم در مقاطع بالاتر تحصیلی در مدارس، توجه بیشتری صورت گیرد و برای آن مداخلات مناسب طراحی شود.

۵ نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد، مقطع تحصیلی و شدت اختلال اتیسم با سطح فعالیت‌های بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم مرتبط است؛ به طوری که در مقاطع تحصیلی بالاتر و با شدت اختلال اتیسم، سطح فعالیت بدنی این افراد کاهش می‌یابد.

۶ تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله از مدیران، مربیان مراکز و انجمن‌های اتیسم سراسر کشور که در این طرح همکاری کردند، کمال تشکر را دارند.

۷ بیانیه‌ها

تأییدیه اخلاقی و رضایت از شرکت‌کنندگان

در اجرای پژوهش ملاحظات اخلاقی مطابق با دستورعمل کمیته اخلاق پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در نظر گرفته شد. همچنین کد اخلاق به شماره REC.SSRI.1400-1289 دریافت شد.

رضایت برای انتشار

این امر غیرقابل اجرا است.

تضاد منافع

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول خانم سروین سالار در گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (تربیت‌بدنی سازگاران)، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان است. بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت یکسان داشتند.

در سطح فعالیت بدنی یافت نشد و به یک میزان در فعالیت‌های بدنی شرکت کردند. این امر می‌تواند به دلیل آن باشد که شاید در صورت فراهم بودن سایر عوامل درونی مانند اعتماد به نفس و انگیزش در کنار فرصت‌های مشارکت در فعالیت بدنی برای کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم، اختلالات همبود، عامل درخور توجهی بر سطح فعالیت بدنی نیست.

همچنین نتایج یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد، بین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با توجه به مقطع تحصیلی و شدت اختلال تفاوت معناداری وجود داشت. این تفاوت می‌تواند ناشی از تغییرات سنی و مسائل مربوط به نیاز به روابط متقابل اجتماعی در سنین بیشتر باشد. در توضیح نقش سن و مقطع تحصیلی در میزان مشارکت در فعالیت‌های بدنی، معماری و همکاران دریافتند، کودکان با اختلال طیف اتیسم در سنین دبستان در روزهای هفته و آخر هفته در مقایسه با کودکان با اختلال طیف اتیسم در سنین راهنمایی، بیشتر در فعالیت‌های بدنی شرکت دارند؛ علاوه بر این کودکان در سنین ابتدایی در مقایسه با سنین راهنمایی زمان بیشتری را به فعالیت‌های کم‌تحرک در روزهای هفته و آخر هفته اختصاص می‌دهند؛ همچنین زمان کم‌تحرکی در آخر هفته بیشتر از روزهای هفته است که می‌تواند به دلیل کاهش کنترل خانواده‌ها و سخت‌گیری کمتر و داشتن زمان فراغت بیشتر کودکان و نوجوانان باشد. به علاوه گزارش شد که با افزایش سن، فعالیت‌های بدنی برای کودکان با اختلال طیف اتیسم پیچیده‌تر می‌شود و بنابراین نوجوانان با اختلال طیف اتیسم ممکن است در پیروی از قوانین و انجام کارهای پیچیده حرکتی دچار مشکل شوند (۲۳). در مطالعه‌ای روی ۵۳ کودک با اختلال طیف اتیسم و ۴۳ کودک غیر اتیسم، نتایج نشان داد که در هر دو گروه، کودکان کوچک‌تر فعالیت بدنی بیشتری در مقایسه با کودکان بزرگ‌تر دارند (۲۹). این یافته‌ها با نتایج پژوهش حاضر همسوست؛ به طوری که افزایش سن و مقاطع تحصیلی بر سطح فعالیت بدنی اثر دارد.

پژوهش حاضر دارای محدودیت‌هایی بود؛ از جمله برای ارزیابی سطح کلی فعالیت بدنی از پرسش‌نامه استفاده شد که تخمینی از میزان

References

- Lang R, Koegel LK, Ashbaugh K, Register A, Ence W, Smith W. Physical exercise and individuals with autism spectrum disorders: a systematic review. *Res Autism Spectr Disord*. 2010;4(4):565–76. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.01.006>
- Ferreira JP, Andrade Toscano CV, Rodrigues AM, Furtado GE, Barros MG, Wanderley RS, et al. Effects of a physical exercise program (PEP-Aut) on autistic children's stereotyped behavior, metabolic and physical activity profiles, physical fitness, and health-related quality of life: a study protocol. *Front Public Health*. 2018;6:47. <http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2018.00047>
- Pan CY, Tsai CL, Chu CH, Sung MC, Ma WY, Huang CY. Objectively measured physical activity and health-related physical fitness in secondary school-aged male students with autism spectrum disorders. *Phys Ther*. 2016;96(4):511–20. <https://doi.org/10.2522/ptj.20140353>
- Croen LA, Zerbo O, Qian Y, Massolo ML, Rich S, Sidney S, et al. The health status of adults on the autism spectrum. *Autism*. 2015;19(7):814–23. <https://doi.org/10.1177/1362361315577517>
- Kohl HW, Craig CL, Lambert EV, Inoue S, Alkandari JR, Leetongin G, et al. The pandemic of physical inactivity: global action for public health. *The Lancet*. 2012;380(9838):294–305. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60898-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60898-8)
- Sorensen C, Zarrett N. Benefits of physical activity for adolescents with autism spectrum disorders: a comprehensive review. *Rev J Autism Dev Disord*. 2014;1(4):344–53. <https://doi.org/10.1007/s40489-014-0027-4>
- Memari AH, Panahi N, Ranjbar E, Moshayedi P, Shafiee M, Kordi R, et al. Children with autism spectrum disorder and patterns of participation in daily physical and play activities. *Neurology Research International*. 2015;2015:1–7. <http://dx.doi.org/10.1155/2015/531906>
- Duquette MM, Carbonneau H, Roullet R, Crevier L. Sport and physical activity: facilitating interventions with young people living with an autism spectrum disorder. *Physical Activity Review*. 2016;4:40–9. <https://doi.org/10.16926/par.2016.04.05>

9. Obrusnikova I, Cavalier AR. Perceived barriers and facilitators of participation in after-school physical activity by children with autism spectrum disorders. *J Dev Phys Disabil*. 2011;23(3):195–211. <https://doi.org/10.1007/s10882-010-9215-z>
10. Menear KS, Neumeier WH. Promoting physical activity for students with autism spectrum disorder: barriers, benefits, and strategies for success. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. 2015;86(3):43–8. <https://doi.org/10.1080/07303084.2014.998395>
11. Pan CY. Motor proficiency and physical fitness in adolescent males with and without autism spectrum disorders. *Autism*. 2014;18(2):156–65. <https://doi.org/10.1177/1362361312458597>
12. Kwan MY, Cairney J, Faulkner GE, Pullenayegum EE. Physical activity and other health-risk behaviors during the transition into early adulthood. *Am J Prev Med*. 2012;42(1):14–20. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2011.08.026>
13. Shattuck PT, Wagner M, Narendorf S, Sterzing P, Hensley M. Post–high school service use among young adults with an autism spectrum disorder. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2011;165(2):141–6. <https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2010.279>
14. Cohen J. Statistical power analysis. *Curr Dir Psychol Sci*. 1992;1(3):98–101. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10768783>
15. Crocker PRE, Bailey DA, Faulkner RA, Kowalski KC, McGrath R. Measuring general level of physical activity: preliminary evidence for the Physical Activity Questionnaire Older Children. *Med Sci Sports Exerc*. 1997;29(10):1344–9. doi: [10.1097/00005768-199710000-00011](https://doi.org/10.1097/00005768-199710000-00011)
16. Kowlaski KC, Crocker PRE, Kowalski NP. Convergent validity of the Physical Activity Questionnaire for Adolescents. *Pediatr Exerc Sci*. 1997;9(4):342–52. <https://doi.org/10.1123/pes.9.4.342>
17. Janz KF, Lutuchy EM, Wenthe P, Levy SM. Measuring activity in children and adolescents using self-report: PAQ-C and PAQ-A. *Med Sci Sports Exerc*. 2008;40(4):767–72. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3181620ed1>
18. Yeylaghi Ashrafi MR, Zamani L, Khalaji H. Validity and reliability of the Persian version of the Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) 14–19 years. *Journal of University of Mazandaran*. 2021. [Persian] https://journals.umz.ac.ir/article_3306.html?lang=en
19. Zamani L, Yeylaghi Ashrafi MR, Khalaji H. Psychometric properties of the Persian version of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C). *Sport Physiology*. 2020;11(44):123–42. [Persian] <https://doi.org/10.22089/spj.2020.8328.1988>
20. Bandini LG, Gleason J, Curtin C, Lividini K, Anderson SE, Cermak SA, et al. Comparison of physical activity between children with autism spectrum disorders and typically developing children. *Autism*. 2013;17(1):44–54. <https://doi.org/10.1177/1362361312437416>
21. Stanish HI, Curtin C, Must A, Phillips S, Maslin M, Bandini LG. Physical activity levels, frequency, and type among adolescents with and without autism spectrum disorder. *J Autism Dev Disord*. 2017;47(3):785–94. <https://dx.doi.org/10.1007/s10803-016-3001-4>
22. Hillier A, Buckingham A, Schena D. Physical activity among adults with autism: participation, attitudes, and barriers. *Percept Mot Skills*. 2020;127(5):874–90. <https://doi.org/10.1177/0031512520927560>
23. McCoy SM, Morgan K. Obesity, physical activity, and sedentary behaviors in adolescents with autism spectrum disorder compared with typically developing peers. *Autism*. 2020;24(2):387–99. <https://doi.org/10.1177/1362361319861579>
24. Memari AH, Ghaheri B, Ziaee V, Kordi R, Hafizi S, Moshayedi P. Physical activity in children and adolescents with autism assessed by triaxial accelerometry: physical activity behaviours in autism. *Pediatr Obes*. 2013;8(2):150–8. <https://doi.org/10.1111/j.2047-6310.2012.00101.x>
25. Siracusano M, Postorino V, Riccioni A, Emberti Gialloreti L, Terribili M, Curatolo P, et al. Sex differences in autism spectrum disorder: repetitive behaviors and adaptive functioning. *Children*. 2021;8(5):325. <https://doi.org/10.3390/children8050325>
26. McCoy SM, Jakicic JM, Gibbs BB. Comparison of obesity, physical activity, and sedentary behaviors between adolescents with autism spectrum disorders and without. *J Autism Dev Disord*. 2016;46(7):2317–26. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2762-0>
27. Rebeor SM. The relationship between physical activity and autism severity in youth, ages 6–17 [PhD dissertation]. [Denver, Colorado]: The University of the Rockies; 2018.
28. Must A, Eliasziw M, Phillips SM, Curtin C, Kral TVE, Segal M, et al. The effect of age on the prevalence of obesity among us youth with autism spectrum disorder. *Childhood Obesity*. 2017;13(1):25–35. <https://doi.org/10.1089/chi.2016.0079>
29. Hallett R. Physical activity for autistic adults: recommendations for a shift in approach. *Autism Adulthood*. 2019;1(3):173–81. <https://doi.org/10.1089/aut.2019.0016>